

Dorzolamide 眼藥製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	規格
Dorzolamide	Trusopt	舒露瞳點眼液劑	2% ; 5 毫升/瓶

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 可降低眼睛房水的分泌，用於降低眼內壓或治療青光眼。

◆ **用量與用法：**

1. 使用前請先將手洗淨擦乾。

2. 打開瓶蓋，頭部往後仰或平躺。

3. 一手手指置於眼睛正下方之臉頰處，輕輕下拉下眼瞼，使眼球及眼瞼分開形成一個眼窩。以另一手拇指及中指握住藥水瓶並朝下，將眼藥水點在眼窩穹窿內。一次投予一滴或依醫師指示的藥量投予，注意瓶嘴不要接觸到睫毛或眼睛，以防藥水瓶受到污染。

4. 閉上眼睛，同時用手指頭壓住兩鼻側淚管開口 3~5 分鐘。

5. 用畢，蓋上瓶蓋，若有流至眼睛周圍之眼藥水或淚水可用紙巾擦拭乾淨，使用後再洗手。

6. 若需點兩種以上眼藥水時，請相隔 10 分鐘以上再重複上述步驟點第二種眼藥水。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥任一成分過敏者。

2. 嚴重腎功能異常($CrCl < 30 \text{ ml/min}$)或高氯性酸中毒。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存於室溫 30°C 以下陰涼處，避免陽光直射。

2. 開瓶使用後只能存放 1 個月，1 個月後未用畢請丟棄。

3. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人使用。

◆ **注意事項：**

1. 本藥含 benzalkonium chloride 防腐劑，點藥前應先摘除隱型眼鏡並至少等 15 分鐘再戴上。

2. 本藥屬於磺胺類藥物，雖然是局部眼用，投藥吸收後會進入全身循環系統，因此曾因使用磺胺類藥物而發生嚴重過敏或皮膚反應的病人，請小心使用。若發生過敏或皮膚反應，請立即停藥。

3. 本藥雖然是局部眼用，但仍有少數尿路結石的案例發生，因此過去有腎結石病史的病人，應小心注意結石復發。

4. 用藥後可能會有短暫的視力模糊或頭暈，駕車、從事危險性活動或工作時應小心。

5. 若您有眼睛受感染、受傷或將接受眼睛手術的情形，請告知醫生。

◆ **可能引起的副作用：**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

- 過敏：蕁麻疹；皮膚紅腫、起水泡或脫皮；吞嚥或說話困難、呼吸困難。
- 視力改變、眼睛疼痛或嚴重眼睛刺激。眼瞼紅、腫、痛、脫皮。
- 尿路結石：腰痛、排尿疼痛。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

頭痛、噁心、苦澀味、眼睛灼熱與刺痛、淺層點狀角膜炎、多淚、眼睛癢、視力模糊。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/11/16 修訂】

BTC00EV20-02