

## Fluorometholone/Tetrahydrozoline 眼用懸浮液衛教單張

| 學名   | 商品名      | 中文名    | 規格     |
|--|----------|--------|--------|
| Fluorometholone 0.1% + Tetrahydrozoline 0.025% | Flozolin | 復舒寧眼藥水 | 5 毫升/瓶 |

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 含類固醇與血管收縮劑，類固醇可用於緩解眼部的發炎症狀，血管收縮劑可用於緩解結膜腫脹、充血及不適症狀。

◆ **用量與用法：**

1. 先將手洗淨擦乾。
2. 使用前請先將眼藥水搖勻，打開瓶蓋，頭部往後仰或平躺。
3. 一手手指置於眼睛正下方之臉頰處，輕輕下拉下眼瞼，使眼球及眼瞼分開形成一個眼窩。以另一手拇指及中指握住藥水瓶並朝下，將眼藥水點在眼窩穹窿內。一次投予一滴或依醫師指示的藥量投予，注意瓶嘴不要接觸到睫毛或眼睛，以防藥水瓶受到污染。
4. 閉上眼睛，同時用手指頭壓住兩鼻側淚管開口 3~5 分鐘。
5. 用畢，蓋上瓶蓋，若有流至眼睛周圍之眼藥水或淚水可用紙巾擦拭乾淨，使用後再洗手。
6. 若需同時點其他眼藥水時，本藥需後點，前項藥水用畢後隔 5 分鐘以上再依上述步驟點復舒寧眼藥水。若同時使用眼藥膏，眼藥膏後點。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥任一成分或其他類固醇過敏者。
2. 角膜受傷及發生潰瘍，尤其受病毒、細菌及真菌感染時(如單純性疱疹、牛痘、未經治療之化膿性感染、肺結核)。
3. 與角膜或鞏膜基質損傷有關之疾病，局部使用類固醇可能導致組織穿孔。
4. 乾眼症，特別是乾性角膜結膜炎(Sjogren's 症候群)，使用本品無效。
5. 感染性結膜炎或角膜炎、青光眼、2 歲以下幼兒使用前請先經醫師診治。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存於室溫 15-25°C 陰涼處，避免陽光直射。
2. 開瓶後最多只能存放一個月，逾時請丟棄。不用時請栓緊瓶蓋。
3. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人使用。

◆ **注意事項：**

1. 本品為懸浮液劑型，使用前請充分搖晃藥瓶使藥水均勻，若併用其他眼藥水，眼藥水點完後隔 5 分鐘再使用本品。若併用眼藥膏，本品點完後隔 10 分鐘再使用眼藥膏。
2. 本品含 benzalkonium chloride 防腐劑，可能會對眼睛造成刺激及造成軟式隱形眼鏡變色。眼部感染時不應配戴隱形眼鏡，如需配戴，點藥前需取下隱型眼鏡，並等待至少 30 分鐘後再戴上。
3. 本品含血管收縮劑，雖為局部眼用，仍有可能吸收後影響全身，患有嚴重心血管疾病、甲狀腺疾病、糖尿病等，請小心使用，注意惡化症狀。
4. 乾性鼻炎患者長期使用本品，可能出現反彈性充血(鼻塞)現象，請小心使用。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/11/16 修訂】

BTC00EV25-02

### Fluorometholone/Tetrahydrozoline 眼用懸浮液衛教單張

| 學名   | 商品名      | 中文名    | 規格     |
|--|----------|--------|--------|
| Fluorometholone 0.1% + Tetrahydrozoline 0.025% | Flozolin | 復舒寧眼藥水 | 5 毫升/瓶 |

5. 用藥後可能會有短暫的視力模糊，駕車或進行危險性工作時，應格外謹慎。
6. 長期使用此藥可能增大罹患白內障、青光眼或眼部感染的風險，請定期回診眼科檢查。
7. 請依照醫師指示使用，勿超過醫師指示的時間長度。若使用 2 天後症狀未減輕，請回診請醫師重新評估。
8. 本品原則上不使用於病毒、結核菌、黴菌或真菌感染引發的炎症，請經醫師診治後再使用，勿自行使用。

#### ◆ 可能引起的副作用：

##### 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

- 嚴重過敏反應。
- 視力改變、眼睛疼痛或嚴重眼睛刺激。
- 心悸、心律不整、胸悶、胸痛、呼吸困難。

##### 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

眼睛刺激、灼熱或刺痛、視力模糊、眼中異物感、味覺改變、反彈性充血(長期使用)、黏膜刺激及乾燥、高血壓、頭痛、發抖、出汗。