

## Tobramycin/Dexamethasone 眼用製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	規格
Tobramycin 0.3% Dexamethasone 0.1%	Tobradex onit.	點必舒眼藥膏	3.5 克/支

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 含抗生素 tobramycin 及類固醇 dexamethasone，用於對類固醇具有感受性之眼部疾患。

◆ **用量與用法：**

1. 先將手洗淨擦乾。
2. 打開瓶蓋，頭部往後仰或平躺。
3. 一手手指置於眼睛正下方之臉頰處，輕輕下拉下眼瞼，使眼球及眼瞼分開形成一個眼窩。以另一手拇指及中指握住藥膏開口朝下，將眼藥膏擠出約 1-1.5 公分或依醫師指示的藥量，點在眼窩穹窿內。注意管口不要接觸到睫毛或眼睛，以防藥膏受到污染。
4. 眼睛輕閉約 2 分鐘，並轉動眼球使藥物均勻分布。
5. 用畢，蓋上瓶蓋，若有流至眼睛周圍之眼藥水或淚水可用紙巾擦拭乾淨，使用後再洗手。
6. 若同時需點眼藥水時，請先點眼藥水，間隔 10 分鐘後再依上述步驟點眼藥膏。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥任一成分過敏者。
2. 單純疱疹性角膜炎。
3. 牛痘、水痘及其他因病毒引起的角膜、結膜疾病。
4. 眼部之黴菌感染或寄生蟲眼部感染。
5. 眼部分枝桿菌感染。
6. 角膜上異物未完全去除者。

◆ **藥品儲存：**

1. 請儲存於室溫 8-27°C 陰涼處，避免陽光直射。
2. 開封後最多只能存放 28 天，逾時請丟棄。不用時請栓緊瓶蓋。
3. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人使用。

◆ **注意事項：**

1. 若同時需使用眼藥水時，請先使用眼藥水，間隔 10 分鐘以上再使用藥膏。
2. 本品含防腐劑，可能會對眼睛造成刺激及造成軟式隱形眼鏡變色。眼部感染時不應配戴隱形眼鏡，如有配戴之必要，點藥前需取下隱型眼鏡，並等待至少 15 分鐘後再戴上。
3. 用藥後可能會有短暫的視力模糊，請待視力恢復正常時再駕車或操作機械。
4. 請依照醫師指示使用，勿自行停藥或使用超過醫師指示的時間長度。若使用 2 天後症狀未減輕，請回診請醫師重新評估。
5. 長期使用此藥可能增大罹患白內障、青光眼或眼部感染的風險，請定期回診眼科檢查。
6. 局部眼用類固醇可能會減緩角膜傷口癒合，角膜受損者請小心使用。
7. 本品原則上不使用於病毒、結核菌、黴菌或真菌感染引發的炎症，請經醫師診治後再使用，勿自行使用。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/11/24 修訂】

BTC00EV40-02

### Tobramycin/Dexamethasone 眼用製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	規格
Tobramycin 0.3% Dexamethasone 0.1%	Tobradex onit.	點必舒眼藥膏	3.5 克/支

◆ **可能引起的副作用：**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

- 過敏反應、過敏性休克：蕁麻疹、咽喉及臉部水腫、呼吸困難、血壓降低、喪失意識。
- 視力改變、眼睛疼痛或嚴重眼睛刺激。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

眼睛痛、眼睛搔癢、眼睛刺激、眼睛充血、視力模糊、眼內壓增加、流淚、頭痛、頭暈、味覺異常。