

Liquid paraffin and lanolin 眼藥劑衛教單張

學名	商品名	中文名	規格
Liquid paraffin and lanolin	Duratears sterile oph oint	淚膜眼藥膏	3.5 克/支

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 為眼用潤滑藥膏，每克含有 anhydrous liquid lanolin (羊毛脂) 30 毫克及 mineral oil (礦物油) 30 毫克，於眼球可快速溶解及防止乾燥，暫時緩解因眼睛乾澀所引起的灼熱感與刺激感。

◆ **用量與用法：**

1. 使用前請先將手洗淨擦乾。
2. 打開瓶蓋，頭部往後仰或平躺。
3. 一手手指置於眼睛正下方之臉頰處，輕輕下拉下眼瞼，使眼球及眼瞼分開形成一個眼窩。以另一手拇指及中指握住藥管並朝下，將眼藥膏擠出約 1 公分長在眼窩穹窿內。注意管口不要接觸到睫毛或眼睛，以防藥膏受到污染。
4. 眼睛輕閉約 2 分鐘，並轉動眼球使藥物均勻分布。
5. 用畢，蓋上瓶蓋，若有流至眼睛周圍之眼藥水或淚水可用紙巾擦拭乾淨，使用後再洗手。
6. 若同時需點眼藥水時，請先點眼藥水，間隔 10 分鐘後再依上述步驟點眼藥膏。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥任一成分過敏者。

◆ **藥品儲存：**

1. 未開瓶儲存於 8-30°C 陰涼處，避免陽光直射。
2. 開瓶後置室溫下儲存只能保存 28 天，逾時未用畢請丟棄。每次用畢請蓋緊瓶蓋。
3. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人使用。

◆ **注意事項：**

1. 本品不適合戴隱形眼鏡時使用，點藥前需取下隱型眼鏡。
2. 用藥後可能會有視力模糊現象發生，建議在睡前使用較適宜。使用後應避免從事需清楚視力的活動，如駕車或操作機械，直到視力恢復正常。
3. 使用前請先確認藥品品質，藥液混濁、變色或出現異物時請丟棄。
4. 若使用 3 天後症狀未改善，請回診請醫師重新評估。
5. 若同時需使用眼藥水時，請先使用眼藥水，間隔 10 分鐘以上再使用藥膏。

◆ **可能引起的副作用：**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
 - 過敏反應。
 - 眼睛劇痛、持續視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
眼睛搔癢、眼睛刺激、視力模糊、眼睛異物感、眼睛充血、頭痛。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/11/23 修訂】

BTC00EV30-02