

Olmesartan 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Olmesartan medoxomil	Olmetec®	雅脈膜衣錠	40 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 治療高血壓：要長期且按時服用，才能確保療效。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥或其他成份過敏者。
2. 糖尿病病患或腎功能不全病患(GFR<60ml/min/1.73 m²)同時使用含 aliskiren 成份藥品。
3. 孕婦。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 服用本藥後可能會發生想睡、頭昏、暈眩。請勿開車、操作機械或從事危險性高的動作，直到您習慣此藥對您的影響。
2. 本藥可能會導致血中的鉀離子過高，應多注意且控制含鉀鹽食物(如代鹽)的攝取，可先請教醫師或營養師。
3. 曾有使用此藥數月至數年的病人，發生嚴重的慢性腹瀉並伴隨體重明顯減輕。用藥期間，若出現嚴重腹瀉或體重明顯下降之情形，請立即回診。
4. 運動後大量流汗、腹瀉、嘔吐等有水份流失的狀況時，應補充水分避免低血壓發生。
5. 若您還有服用降血脂藥 colesevelam，二者同時服用會減少本藥的吸收，造成降血壓效果不佳，故應在服用本藥至少 4 小時後再服用 colesevelam。
6. 懷孕期間服藥，可能會造成生育缺陷或流產。育齡女性服藥期間應避孕。若服藥期間發現懷孕，應立即停藥，並儘速就醫。
7. 計畫懷孕或哺乳，有心臟疾病、肝腎疾病病史者或血液中鉀或鈉含量低，請先告知醫師。
8. 有使用任何藥物，包括處方藥、非處方藥、維他命、中草藥，特別是鋰鹽(Lithium)、降血壓藥(ACE inhibitor)、利尿劑(Diuretic)、非類固醇類消炎止痛藥 NSAID，請先告知醫師。
9. 自行停藥可能會導致無徵兆的病情惡化，因此未經醫師指示請勿擅自停止服用本藥品。
10. 除藥物治療外，同時應配合飲食控制及適度的運動來控制血壓。
11. 請定期測量血壓、脈搏速率及注意身體狀況，以作為醫師調整藥物的依據。
12. 請定期至醫院就診及檢查，以確保藥物療效及用藥安全。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2021/12/30 修訂】

BTC00EF37-02

Olmesartan 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Olmesartan medoxomil	Olmetec®	雅脈膜衣錠	40 毫克/錠

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

- 過敏反應：蕁麻疹；臉或手腫脹、唇或喉嚨腫脹、吞嚥或說話困難；胸悶、呼吸困難。
- 腎功能異常：排尿量或排尿次數減少、四肢水腫、體重大幅增加。
- 頭暈、頭暈或昏厥。
- 嚴重腹瀉、體重明顯減輕。
- 高血鉀：心跳異常；感到困惑；感到虛弱無力、暈眩或頭昏眼花；昏厥感；麻木或刺痛感；或呼吸短促

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

眩暈、無力、嘔吐、禿髮。