

Ciclosporine 眼用製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Ciclosporine	Ikervis® eye emulsion	宜可利眼用乳劑 0.1%	1 毫克/毫升；0.3 毫升/支

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 本藥為免疫抑制劑，具抗發炎作用，局部使用於眼部用於治療嚴重乾性角結膜炎併角結膜上皮病變患者之發炎反應，及嚴重春季型角膜結膜炎。

◆ **用量與用法：**

1. 使用前請先將手洗淨擦乾。若有配戴隱形眼鏡請取下隱形眼鏡。
2. 將單劑量小瓶上下顛倒數次，形成均勻白色不透明乳液。
3. 轉下上蓋，頭部往後仰或平躺。
4. 一手手指置於眼睛正下方之臉頰處，輕輕下拉下眼瞼，使眼球及眼瞼分開形成一個眼窩。以另一手拇指及中指握住單劑量小瓶並朝下，將眼用乳劑滴在眼窩穹窿內。一次投予一滴或依醫師指示的藥量投予，注意瓶口不要接觸到睫毛或眼睛，以防藥水瓶受到污染。
5. 眨眼數下，讓藥物覆蓋您的眼部。
6. 閉上眼睛，同時用手指頭壓住眼部靠近鼻子的一角(鼻淚管開口) 2 分鐘。
7. 用畢，請丟棄剩餘藥水，若有流至眼睛周圍之眼藥水或淚水可用紙巾擦拭乾淨。結束後再洗手。
8. 若同時使用其他點眼液如人工淚液，請在使用其他點眼液後至少 15 分鐘再使用宜可利眼用乳劑。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥或其賦形劑成分過敏者
2. 目前有或疑似眼部或眼窩感染者。
3. 眼部具有惡性腫瘤或癌前病變者。

◆ **忘記用藥時該如何處理？**

想起時儘快用藥；若接近下次用藥時間，按時使用下次劑量即可，千萬不可使用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 30°C 以下陰涼處，避免陽光直射。請勿冷凍。
2. 單次使用小瓶應置於原鋁箔包裝內避光儲存，要用前再取出。
3. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人使用。

◆ **注意事項：**

1. 單位劑量小瓶限單次使用，開封後應立即使用，剩餘藥劑應丟棄。
2. 眼部不適不建議配帶隱形眼鏡，若無法避免，投藥前請先取下隱形眼鏡。
3. 點藥時請注意勿讓瓶口尖端碰觸到眼睛、眼瞼或其他部位皮膚，以免造成藥物汙染或眼睛表淺損傷。
4. 接受免疫抑制治療者有較高的感染風險，可能會發生全身性或局部感染，也可能使原本的感染惡化。治療期間應勤洗手，避免揉眼或接觸感染源，如有感染徵兆，請立即回診。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150【2022/3/24 修訂】

BTC00EV43-02

Ciclosporine 眼用製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Ciclosporine	Ikervis® eye emulsion	宜可利眼用乳劑 0.1%	1 毫克/毫升；0.3 毫升/支

5. 點藥後可能會造成短暫的視力模糊，駕車或做其他需要有清楚視力的工作時請小心。
6. 懷孕或準備懷孕、眼部感染、眼部惡性腫瘤或有任何病史、正使用含類固醇的藥品，請先告知醫師。

◆ **可能引起的副作用和發生時的處理方法：**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
 - 嚴重過敏：蕁麻疹、面部或手部腫脹、舌頭腫脹或咽喉水腫或刺痛、胸悶或呼吸困難。
 - 眼睛劇痛、持續視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
眼痛、頭痛、眼部搔癢、眼部充血、眼部刺激、視力模糊、眼中有異物感、淚液分泌增加、眼瞼紅斑、眼瞼水腫、咳嗽。