

Diquafosol Sodium 眼藥劑衛教單張

| 學名 | 商品名 | 中文名 | 規格 |
|-------------------|---------|--------|------------|
| Diquafosol Sodium | Diquas® | 滴舒適點眼液 | 3%；15 毫升/瓶 |

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
可促進眼睛水份及黏蛋白(淚液的成份)的分泌，並改善角膜上皮的受損。用於治療乾眼症及乾性角結膜炎病人之角膜以及結膜上皮損傷。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 使用前請先將手洗淨擦乾。
 2. 打開瓶蓋，頭部往後仰或平躺。
 3. 一手手指置於眼睛正下方之臉頰處，輕輕下拉下眼瞼，使眼球及眼瞼分開形成一個眼窩。以另一手拇指及中指握住藥水瓶並朝下，將眼藥水點在眼窩穹窿內。一次投予一滴或依醫師指示的藥量投予，注意瓶嘴不要接觸到睫毛或眼睛，以防藥水瓶受到污染。
 4. 閉上眼睛，同時用手指頭壓住兩鼻側淚管開口 3~5 分鐘。
 5. 用畢，蓋上瓶蓋，若有流至眼睛周圍之眼藥水或淚水可用紙巾擦拭乾淨，使用後再洗手。
 6. 若需點兩種以上眼藥水時，請相隔 5 分鐘以上再重複上述步驟點第二種眼藥水。若同時使用眼藥膏，請相隔 10 分鐘後再點眼藥膏。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 對本藥任一成分過敏者。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 未開瓶儲存於室溫 25°C 以下陰涼處，避免陽光直射。
 2. 開瓶後置室溫下儲存只能保存一個月，逾時未用畢請丟棄。每次用畢請蓋緊瓶蓋。
 3. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人使用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 本品含防腐劑，可能會對眼睛造成刺激及造成軟式隱形眼鏡變色，點藥前需取下隱型眼鏡，並等待至少 30 分鐘後再戴上。
 2. 用藥後可能會有短暫的視力模糊，駕車或進行危險性工作時，應格外謹慎。
 3. 使用前請先確認藥品品質，藥液混濁、變色或出現異物時請丟棄。
 4. 如需同時使用二種以上眼藥水時，請間隔 5 分鐘以上；如需同時使用眼藥水及眼藥膏時，請先使用眼藥水，間隔 10 分鐘以上再使用藥膏。
- ◆ **可能引起的副作用：**
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
 - 嚴重過敏反應。
 - 眼睛劇痛、持續視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
眼睛刺激、視力模糊、眼睛分泌物、結膜充血、眼睛疼痛、眼睛搔癢、眼睛內有異物感、畏光、流眼淚。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2022/3/24 修訂】

BTC00EV44-02