

## Piracetam 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Piracetam	Piracetam® oral soln	派卡登內服液劑	200 毫克/1 毫升；200 毫升/瓶

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 對腦血管障礙及老化所引起的智力障礙可能有效。
2. 皮質性陣發性抽搐之輔助療法。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數。
2. 對皮質性陣發性抽搐的患者，應避免驟然停藥，否則可能導致驟然復發或因斷除引起發作。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥品任一成分或 pyrrolidone 衍生物過敏。
2. 腦內出血、腎疾末期(end stage renal disease)。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，毋須冰存並避免陽光直射。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 本藥會影響血小板凝集，有止血考量的患者，特別是動手術或嚴重出血者，需特別注意。
2. 您可能會更容易出血，應小心避免受傷，使用軟毛牙刷和電動剃鬚刀。
3. 服藥後可能會影響開車及操作機械能力，需小心注意。
4. 腎功能不良、腦出血或亨爾頓氏舞蹈病、計畫懷孕或哺乳，請先告知醫師。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

- 過敏反應：蕁麻疹；發癢；皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，而且有可能伴隨發燒；喘鳴；胸口或喉嚨緊繃；難以呼吸、吞嚥或說話困難；嗓音異常嘶啞；或嘴巴、臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。
- 出血症狀：嘔血或咳血；似咖啡渣的嘔吐物；血尿；黑色、紅色或黑便；牙齦出血；陰道異常出血；無理由出現瘀傷或瘀傷變大；無法止住的出血。
- 癲癇發作情況加重或有所改變

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

- 嗜睡、眩暈、體重增加、腹痛、腹瀉、噁心嘔吐、神經質、精神激昂、抑鬱、頭痛、失眠。