

Modafinil 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Modafinil	Provigil®	普衛醒錠	200 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
改善因猝睡症引起的日間過度睡眠症患者的失眠。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
 2. 每日一次於早晨服用。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 對本藥或賦型劑過敏。
 2. 懷孕及計畫懷孕的婦女。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
 1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲存於室溫 20-25°C 下，避光、避濕及避熱。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 任何影響中樞神經系統的藥物皆有可能改變判斷力、思考力或運動技能，在未了解藥品對您的影響前，應避免開車或操作機械，從事危險工作時請小心。
 2. 有下列情況者應先告知醫師並小心使用：曾有心肌梗塞或心絞痛病史、高血壓、精神疾病史、嚴重肝腎功能不全、服用口服避孕藥或合併使用單胺氧化酶抑制劑。
 3. 本藥禁用於懷孕或計畫懷孕之婦女，育齡婦女開始治療前應確認一週內的妊娠試驗結果為陰性，已懷孕、計畫懷孕或哺乳婦女，請先告知醫師。
 4. 本藥可能會降低口服避孕藥和其他基於荷爾蒙的避孕方法的效果，服藥期間及服用最後一劑藥物後的 1 個月內，應採用其他非口服避孕藥的避孕措施（如保險套）。
 5. 此藥未核准用於兒童身上。小孩引發嚴重且有時致命的皮膚反應（史蒂文生-強生症候群）的機率可能會提高。不過，您的小兒醫師可能會判定使用此藥的益處可能大於其風險。若對於讓您的小孩使用此藥有任何疑問，請洽詢您的醫師。
 6. 曾有精神症狀副作用之報告，尤其是先前有精神病史(如憂鬱症、狂躁症等)之患者，若出現躁狂症、妄想症、幻覺、自殺傾向，請告知醫師。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
 1. 如發生以下症狀時，請停藥立即就醫
 - 嚴重過敏反應：紅疹、蕁麻疹、口腔疼痛、眼水泡、脫皮、吞嚥困難或呼吸困難等。
 - 精神症狀如躁狂症、妄想症、幻覺、自殺傾向等。
 - 胸痛、心悸、呼吸短促、頭痛、頭暈、視力改變。
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
頭痛、噁心、神經不安、焦慮、腹瀉、背痛、鼻炎、失眠、疲倦及消化不良。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2022/4/7 修訂】

BTC00EG08-02