

## Acetaminophen/Tramadol 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Acetaminophen/Tramadol	Utraphen®	立除痛膜衣錠	Acetaminophen 325 毫克 & Tramadol 37.5 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)  
用於非鴉片類止痛劑無效的中度至嚴重性疼痛。
- ◆ **用量與用法：**
  1. 建議劑量為每四至六小時服用一至兩錠，視需要減輕疼痛，一天最多服用八錠。
  2. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
  1. 之前曾對 tramadol、acetaminophen、本品其它成份或鴉片過敏的病人。
  2. 發生酒精、助眠藥、麻醉藥、中樞作用止痛劑、鴉片或精神藥物急性中毒時。
  3. 同時或過去 14 天內使用單胺氧化酶抑制劑(MAOIs)的病人。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
  1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。
  2. 請將藥品存放至孩童拿不到的地方。
- ◆ **注意事項：**
  1. 勿與酒精性飲料同時服用。
  2. 有使用鎮靜劑或其他影響中樞活性的藥物者須小心使用。
  3. 懷孕及哺乳期間不建議使用本藥品。
  4. 嚴重肝功能不全不建議使用。
  5. 當起身站立時，宜放慢動作。
  6. 本品後可能會降低專注力，從事有潛在危險的工作（如駕車或操作機械）需小心。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
  1. 如發生以下症狀時，請立即就醫  
呼吸困難、癲癇發作、厭食、出汗及蒼白等。
  2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師  
眩暈、便秘、昏昏欲睡、口乾、頭痛、噁心、嘔吐。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2022/05/02 修訂】

BTC00EH23-02