

## Bupropion 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Bupropion	Buporin SR	必博寧持續性藥效錠	150mg/tab

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)  
治療尼古丁依賴性，作為戒菸之輔助。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，勿自行增加、減少或突然停藥。
2. 一般用法：前3天，每天1次，每次1錠(150毫克)；第4天以後，每天2次，每次1錠(150毫克)，連續2次劑量之間至少必須間隔8小時。
3. 本品為緩釋的持續藥效錠，應整錠吞服，不可切、壓碎或嚼碎。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥任一成分過敏者。
2. 癲癇患者。
3. 突然停止使用酒精或鎮靜劑患者。
4. 正在接受其他含 bupropion 製劑治療之患者。
5. 目前或先前被診斷罹患貪食症或神經性厭食症之患者。
6. 14天內曾使用單胺氧化酵素抑制劑(MAOI)。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 25°C 以下儲存，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 服藥期間應避免飲酒。
2. 服用此藥的病患可能有較高的風險會產生自殺的想法或行為。對於過去曾有過這些想法與行為的人，風險會更高。若情緒或行為產生變化或較以往更為嚴重、出現自殺的想法或行為，請立即回診。
3. 此藥可能引起癲癇發作機率增高，尤其是服用較高劑量，若服藥後新發生抽搐或抽搐加重，請立即就醫。若有以下危險因子存在，請先告知醫師：
  - (1) 具頭部外傷、中樞神經系統腫瘤、癲癇病史。
  - (2) 服用抗焦慮、鎮靜安眠、抗癲癇藥物，或服用興奮劑、降低食慾的產品。
  - (3) 大量飲酒者。
4. 曾發生使用此藥後出現高血壓的案例，尤其是併用尼古丁貼片的人，服藥期間應注意監測血壓或注意高血壓症狀(嚴重頭痛或頭暈、昏倒或視力改變)。
5. 由於本品及其代謝物會分泌至乳汁中，建議服用本藥品期間不要授乳。
6. 服用本藥可能會影響判斷力或運動及認知能力，操作機械或從事需專注力的活動時請小心，除非已確定本藥對您無影響。
7. 懷孕或計畫懷孕、肝腎功能異常，請先告知醫師。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問  
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2022/7/12 修訂】

## Bupropion 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Bupropion	Buporin SR	必博寧持續性藥效錠	150mg/tab

8. 本藥未核准於 18 歲以下的兒童或青少年使用。

### ◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

#### 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

- 嚴重過敏：癢或蕁麻疹、臉或手腫脹、嘴或喉嚨腫脹或刺痛、胸悶、呼吸困難。
- 癲癇發作：新發生抽搐或抽搐加重。
- 嚴重的血壓升高：嚴重頭痛或頭暈、昏倒或視力改變。
- 沮喪或不正常的思想和行為、自殺傾向。
- 胸痛或胸悶、心動過速或心跳異常。

#### 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

頭痛、震顫、味覺異常、視覺障礙、厭食、失眠、不安、焦慮、耳鳴、血壓升高、潮紅、出汗、口乾、胃腸不適、噁心嘔吐、腹痛、便秘、發燒、胸痛、無力感。