

Fenoterol 吸入製劑衛教單張

商品名	中文名
Berotec N®	備勞喘定量噴霧液

◆ 組成：

一次劑量含支氣管擴張劑 Fenoterol 100mcg，每瓶含 200 次劑量。

◆ 用途：(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
預防和治療支氣管痙攣引起之呼吸困難、預防運動引發之氣喘。

◆ 不宜使用此藥的情形(使用禁忌)

1. 肥大阻塞性心肌病變
2. 心跳過速
3. 對 fenoterol hydrobromide 或本藥任一賦形劑過敏之病患。

◆ 急性發作時如何使用？

對大多數的病人，1 個定劑量即可緩解症狀，若吸入 5 分鐘後呼吸沒有明顯的改善，可投與第 2 個定劑量，每天最多不得投與超過 8 個定劑量。投與第 2 個定劑量後，若治療仍未改善，可能需要再投與數個定劑量，此時應立即請教醫師或就近送醫。

◆ 運動前預防發作之用法：

在運動前給與 1-2 個定劑量，每天不得超過 8 個定劑量。

◆ 使用步驟：

第一次使用前或 3 天以上未使用，請先搖動噴霧器，將活塞下壓 2 次後再開始使用。

(1) 不使用吸入輔助器

1. 移去護蓋，容器的底部與標籤上的箭頭朝上。
2. 充分震搖噴霧器，深深呼氣。
3. 雙唇含著口含器，按壓容器的底部的同時儘可能地深深吸氣。
4. 握住呼吸 5-10 秒，然後自口中移去口含器後呼氣。
5. 若要使用第二個劑量，請間隔 30 秒後再重複步驟 1-4。
6. 使用後蓋上護蓋。

(2) 使用吸入輔助器

1. 移去護蓋。
2. 將吸入輔助器較粗一邊與噴霧液口含器連接。
3. 將護蓋與吸入輔助器較細一邊連接。
4. 上下搖動噴霧罐，同時確認輔助器與噴霧液口含器的連接處是否緊密。
5. 以食指壓噴霧器之底部，並確認有藥物噴霧出現在輔助器內。
6. 先呼氣後除去護蓋，立刻以正常呼吸速度從吸入輔助器之一端吸入。
7. 閉氣 5~10 秒，移去吸入輔助器蓋回護蓋。

吸入器清潔：

1. 每週至少應清潔吸入器的口含器一次。
2. 吸入器的口含器務必要保持清潔，以保藥品不會堆積而阻塞噴霧劑。
3. 先將藥罐拆下，口含器與吸入輔助器可以清水沖洗，並立即陰乾。不可使用任何加熱方式。乾燥後再將藥罐裝回。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2022/7/6 修訂】

BTC00EQ04-02

Fenoterol 吸入製劑衛教單張

商品名	中文名
Berotec N®	備勞喘定量噴霧液

餘藥確認：

此噴霧液可提供 200 次劑量，200 個劑量都被使用後，可能仍有少量液體留存，此時不能提供足量的治療劑量，請勿再使用。

◆ 注意事項：

1. 每次使用前，請務必充分振搖。
2. 除醫師指示外，一天不可超過 8 個劑量。
3. 噴霧劑是經加壓處理，絕不可強力打開或暴露於 50°C 以上的溫度。
4. 若用於急性發作的治療，應隨身攜帶，以防突發狀況。
5. 與其它吸入劑相同，本藥可能反常性的引起支氣管痙攣，若發生喘、呼吸困難，請立即停藥就醫。
6. 罕見地會造成心肌缺血，有心臟疾病者請小心使用，若出現胸痛或心臟病惡化的其他症狀，請立即停藥就醫。
7. 本藥的 fenoterol 成份可能會使運動員禁藥檢測呈現陽性。

◆ 可能引起的副作用和發生時的處理方法：

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
 - 嚴重過敏。
 - 支氣管痙攣、喘、呼吸困難。
 - 胸悶、胸痛、呼吸困難加劇。
 - 快速、劇烈或不均勻的心跳。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

頭痛、眩暈、心悸、咳嗽、喉嚨刺激、激動、精神緊張、顫抖、多汗、噁心、嘔吐、肌肉痙攣、肌肉痛。