

Fenoterol+Ipratropium 吸入劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型	劑量次數
Fenoterol/ Ipratropium	Berodual® N	備喘全定量噴霧液	Fenoterol:50 微克/噴 Ipratropium:20 微克/噴	200 噴/瓶

- ◆ **用途：**(一種藥可能有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
預防和治療支氣管痙攣疾患：支氣管氣喘、阻塞性支氣管炎、慢性支氣管炎、氣腫和伴有支氣管痙攣之肺支氣管障礙。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 已知對 Fenoterol、Atropine 類或配方中的賦形劑過敏者。
 2. 肥厚性阻塞性心肌病變。
 3. 心跳過快性心律不整。
- ◆ **急性發作時如何使用？**

對大多數的患者，急性氣喘發作使用 2 個定劑量即可緩解症狀，若吸入五分鐘後，呼吸沒有明顯的改善，可再投與 2 個定劑量。每日最多投予 8 個定劑量。投與 4 個定劑量後，若治療仍未改善，此時應立即請教醫師或就近送醫。
- ◆ **用量與用法：**

請遵循醫師指示使用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

使用步驟：

在第一次使用之前，需下壓活塞 2 次。

若超過 3 天未使用備喘全，在使用前需先按活塞一次。

 1. 每次使用時先上下搖動吸入器使藥品充分混合，移去護蓋，將容器底部朝上。
 2. 深深呼氣(不要朝著口含器呼氣)後立刻含住口含器，吸氣同時按壓吸入劑的底部以釋出藥品，儘可能深深吸氣吸入藥品。
 3. 閉氣 5 至 10 秒，將吸入劑移開。
 4. 若要使用第二個劑量，請間隔 30 秒後再重複步驟 2-3。
 5. 用後蓋回護蓋。

吸入器清潔：

 1. 每週清潔一次。
 2. 將外殼與藥罐分開，吸入器可以用水清洗，洗完後直接陰乾。勿使用加熱系統烘乾。

餘藥確認：

 1. 此噴霧液可提供 200 次劑量，200 個劑量都被使用後，可能仍有少量液體留存，此時不能提供足量的治療劑量，請勿再使用。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 將備喘全定量噴霧液存放在室溫，容器經加壓處理不可強力打開或暴露於 50°C 以上。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人使用。
- ◆ **忘記用藥時該如何處理？**

想起時儘快使用；若接近下次使藥時間，按時使用下次劑量即可，千萬不可使用兩倍劑量。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2022/7/7 修訂】

BTC00EQ14-02

Fenoterol+Ipratropium 吸入劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型	劑量次數
Fenoterol/ Ipratropium	Berodual® N	備喘全定量噴霧液	Fenoterol:50 微克/噴 Ipratropium:20 微克/噴	200 噴/瓶

◆ **注意事項：**

1. 備喘全定量噴霧液為急性發作的治療藥物應隨身攜帶，以防突發狀況。
2. 如有服用類固醇、利尿劑、digoxin、xanthine 衍生物請先告知醫師。
3. 對罹患嚴重心臟疾病的患者，若出現胸痛或心臟病惡化的症狀，應尋求醫師的建議。
4. 眼睛疼痛或眼睛不舒服、視力模糊、因結膜充血和角膜水腫造成紅眼睛而使得視覺有光暈或彩色影像，有這些症狀請立即請教醫師。
5. 若發生急性且快速惡化的呼吸困難時，應立即請教醫師。
6. 使用備喘全定量噴霧液後不需要漱口。
7. 本藥的 fenoterol 成份可能會使運動員禁藥檢測呈現陽性。

◆ **可能引起的副作用和發生時的處理方法：**

服用藥後副作用不常發生，但偶爾有

症狀	處理方法
- 過敏反應(搔癢、蕁麻疹、面部或手部腫脹、口腔或咽喉腫脹或刺痛、胸悶或呼吸困難) - 胸悶、胸痛、呼吸困難 - 心律不整、心跳過速 - 眼睛疼痛、視力模糊、視覺有光暈或彩色影像	請停藥，並立即就醫
頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、咳嗽、咽喉炎、發音困難、心悸、精神緊張、震顫、口乾、尿液滯留	症狀嚴重或持續時，請告知醫師

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2022/7/7 修訂】

BTC00EQ14-02