

Acetaminophen/Chlorzoxazone/Caffeine/Thiamine 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Acetaminophen/ Chlorzoxazone/ Caffeine/ Thiamine	Soma®	舒肌痛膠囊	A 300 毫克/ Ch 250 毫克/ Ca 20 毫克/ T 7.7 毫克/顆

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
關節痛、肌肉痛、顏面神經痙攣、神經痛、關節周圍炎、捻挫打撲及其他有肌肉之痙攣、強直及疼痛等之諸症。
- ◆ **用量與用法：**
請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 對本藥或其所含賦形劑過敏者。
 2. 嚴重肝功能不全或活動性肝臟疾病。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 - 1 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。
 - 2 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 就診時，應主動告知醫師目前的用藥情形；購買指示藥品時，亦應告知藥師所有正在服用的藥物，以避免重複使用同一成分藥品，造成劑量過高而發生藥物不良反應。
 2. 每個人對藥品反應不同，服用本藥後可能會發生嗜睡、頭昏、暈眩，在未清楚本藥對您的影響前，請勿開車、操作機械或從事危險性高的動作。
 3. 服用本藥避免和含有酒精成分的飲料併服，否則會增加肝臟及頭暈嗜睡的副作用。
 4. 請依醫師指示用藥，勿過量使用。acetaminophen 過量最嚴重之不良反應為致命性之肝臟壞死。亦可能發生腎小管壞死，低血糖昏迷以及凝血異常之不良反應。24 小時可能可以看到初期症狀，包括：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、不適、蒼白及出汗。服用本藥過量的症狀(皮膚或眼睛變黃、食慾降低、噁心或嘔吐、胃部痙攣或胃痛、上腹漲或痛)不會馬上發生，肝毒性的臨床及實驗室證據可能要等到攝入後 48~72 小時才明顯可見。若有上述症狀，請告知醫師。懷疑藥物過量(成人>4 克，兒童每公斤>75 毫克)，應盡速就醫。
 5. 若已懷孕、計畫懷孕、哺乳，肝、腎功能不全，紫質沉著症，癲癇或糖尿病等疾病病史，請告知醫師。
 6. 使用任何藥物(包括處方藥、非處方藥、維他命、中草藥)之前，請諮詢醫師或藥師。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
 - 1 如發生以下症狀時，請立即就醫
-嚴重皮膚反應：皮膚疹、起水泡、黏膜潰瘍、呼吸困難、臉部舌頭腫脹。
-肝功能異常：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、不適、蒼白、出汗、皮膚或眼睛變黃。
 - 2 如下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
頭暈、頭痛、心悸、失眠、嗜睡、視力模糊、胃腸道不適、噁心、過度興奮。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2022/7/11 修訂】

BTC00ER04-02