

Cefixime 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Cefixime	Cexime®	賜信膠囊	100 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
 1. 治療特定細菌所引起之感染症。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 對本藥之成分或頭孢菌素類 (Cephem) 抗生素有過敏病史之患者。
 2. 曾因本藥成分引起休克之患者。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
 1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 治療期間若無醫師指示，請勿自行停藥，即使症狀已好轉，也應繼續服藥直到整個療程結束，以避免抗藥性產生。
 2. 有過敏史或目前有在使用 Warfarin、Carbamazepine 及避孕藥，請先告知醫師。
 3. 若有嚴重、持續性甚至出血性腹瀉，請告知醫師。未經醫師指示，切勿自行服用止瀉藥。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
 - 過敏反應(如臉、唇、喉嚨腫脹、皮膚搔癢、紅疹、蕁麻疹、呼吸困難、原因不明發燒等)。
 - 嚴重腹瀉並伴有血便、胃痙攣甚至發燒。
 - 皮膚長水泡、脫皮。
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
噁心、嘔吐、腸胃不適、腹痛、腹瀉。