

Potassium Citrate 口服粉劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Potassium Citrate	U-citra granules	優暢粒劑	3.3g/pack

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
尿道結石治療劑。利用鹼化尿液的作用減少尿酸、胱氨酸及多種鈣結石的形成。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 可於飯後或睡前服用，醫師會依您尿液的分析評估調整每次用量。
 2. 每包需以 180 ml 冷開水或果汁混合均勻後服用，以減少對腸胃道的傷害。
 3. 飯後服用可避免造成緩瀉作用。
 4. 服藥後應避免高鉀/低鈉鹽飲食，且應儘量攝取充足的水份量(除非醫師囑咐需限制水份)。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 對本品任一成分過敏者。
 2. 嚴重腎障礙伴隨尿少症或氮血症者。
 3. 未治癒之愛迪生氏症(原發性腎上腺功能不全)者。
 4. 遺傳性偶發性無力症(Adynamia episodica hereditaria)。
 5. 急性脫水、熱痙攣。
 6. 嚴重心肌損害。
 7. 任何原因引起之高鉀血症者。
 8. 尿道感染者(提高尿液 pH 值會促進細菌生長)。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**

忘記服藥時，若想起時請盡快補服，若接近下次服藥時間，就請順延到下次服藥時間再吃，切記不可同時服用兩次的藥量
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲存於室溫下陰冷乾燥處，避免直接照光。
 2. 請將藥品存放至孩童拿不到的地方。
- ◆ **注意事項：**
 1. 同時服用心臟血管、腸胃治療藥品及其他類藥品，或使用低鈉鹽時，請先告知您的醫師。
 2. 腎功能不佳、排尿量少病人、孕婦、哺乳婦應先告知醫師。
 3. 與保鉀利尿劑、強心劑併服應小心監測血鉀，若有服用請先告知醫師。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
嚴重的腸胃不適(包括胃痛、腹瀉或黑便)。
高鉀血或鹼中毒(無精打采、神智昏眩、不安等症狀)：此症狀常發生在腎功能不佳的患者。
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
輕微腸胃不適，如腹瀉、噁心、嘔吐或輕瀉：補充水份或於飯後使用，可減少這些不適症狀，若無法改善，請回診時告知醫師。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034。【2022/08/17 修訂】

BTC00E115-02