

Fluticasone 吸入製劑衛教單張

商品名	中文名
Flixotide® Evohaler	輔舒酮優氣吸入劑

◆ 組成：

一次劑量含類固醇 Fluticasone propionate 50 mcg，每瓶含 120 次劑量。

◆ 用途：（一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡）

用於預防性治療成人及兒童氣喘。

◆ 使用方式：

第一次使用或超過一個星期未使用，使用之前應充分震搖噴霧器，並對空氣試噴 2 下，確定噴霧器可以使用。

(1) 不使用吸入輔助器

1. 移去護蓋(輕輕擠壓吸口蓋的兩側)，藥罐的底部朝上。
2. 充分震搖噴霧器。
3. 將吸入器直立於拇指和食指之間，拇指放在底部，即吸口的下方。
4. 呼氣至最舒服而不能再呼氣的時候，將口含器置於齒間，緊閉雙唇，但不要咬住。
5. 按壓吸入器上方的同時經口以**正常呼吸速度**深深吸氣。
6. 握住呼吸並自口中移去口含器，然後盡量閉氣直到不舒服為止(約 5-10 秒)。
7. 若要使用第二次劑量，約 30 秒後重複 2-6 步驟即可。
8. 使用後蓋上護蓋。
9. 結束所有劑量後，以水漱口，**漱口水勿吞下**。

(2) 使用吸入輔助器

1. 移去護蓋(輕輕擠壓吸口蓋的兩側)
2. 將吸入輔助器較粗一邊與噴霧液口含器連接
3. 將護蓋與吸入輔助器較細一邊連接
4. 上下搖動噴霧罐，同時確認輔助器與噴霧液口含器的連接處是否緊密
5. 以食指壓噴霧器之底部，並確認有藥物噴霧出現在輔助器內
6. 先呼氣後除去護蓋，立刻以**正常呼吸速度**從吸入輔助器之一端吸入
7. 握住呼吸並自口中移去吸入輔助器，然後盡量閉氣直到不舒服為止(約 5-10 秒)。
8. 若要使用第二次劑量，約 30 秒後重複 3-7 步驟即可
9. 移去吸入輔助器，蓋回護蓋
10. 結束所有劑量後，以水漱口，**漱口水勿吞下**。

清潔方式：

1. 建議每週清洗一次。
2. 移去護蓋，不要將金屬罐自塑膠外殼中取出。以乾布、面紙或棉布將吸嘴與塑膠殼內外擦拭乾淨，再將護蓋裝回去。
3. 吸入輔助器可以清水洗淨，並立即風乾。

◆ 藥品儲存：

1. 請儲存於 30°C 以下陰涼乾燥處，避免結霜和直接日照。
2. 請勿將金屬罐放入水中，即使是空罐也不可穿刺、打破或灼燒。

Fluticasone 吸入製劑衛教單張

商品名	中文名
Flixotide® Evohaler	輔舒酮優氣吸入劑

◆ 注意事項：

1. 每次用藥後都要漱口，避免口腔及喉部念珠菌感染(鵝口瘡)發生。若口腔或喉嚨發紅或有白苔，請回診告知醫師。
2. 若您的呼吸問題惡化、急救吸藥器沒有發揮作用或需要使用急救吸藥器的頻率提高，請立即聯絡您的醫師。
3. 可能需要使用數週後，才能充分顯現療效。
4. 您有較高的機率會受到感染。經常洗手，遠離受感染、感冒或流行性感冒的人，避免靠近罹患水痘和麻疹的任何人

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
 - 過敏反應。
 - 感染徵象：發燒、發冷、重度喉嚨痛、耳朵或鼻竇疼痛、咳嗽、多痰或痰液有顏色變化、排尿疼痛、口瘡或傷口不癒合。
 - 視力模糊、眼睛疼痛、眼壓升高
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
 - 鼻或咽喉刺激。
 - 聲音沙啞：在吸入後立即以水漱口可以減輕。
 - 口腔或喉嚨發紅或有白苔(口腔及喉部念珠菌感染)