

Dextromethorphan 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Dextromethorphan	Fudecough®	福得可錠	15 毫克/錠
	Regrow®	愛舒可羅膜衣錠	60 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 鎮咳：感冒、咽頭炎、支氣管炎、支氣管擴張症等引起之咳嗽。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數。

2. Regrow (愛舒可羅膜衣錠)為特殊長效劑型，可撥半服用，但請勿嚼碎或磨粉。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥或其所含賦形劑過敏者。

2. 最近 14 天(含)使用過單胺氧化酶抑制劑(MAO inhibitors：如 Moclobemide)。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 抽菸會使降低本藥品的作用，因此服用本藥時，儘可能減少抽菸的次數。

2. 服用本藥後可能會發生想睡、頭昏、暈眩。不要開車、操作機械或從事危險性高的動作，直到您習慣此藥對您的影響。

3. 服用本藥應避免飲用含酒精飲料，因可能會加重嗜眠、暈眩或反應遲鈍的副作用。

4. 12 歲以下孩童請先經醫師診治後使用，請勿自行服用。

5. 若已懷孕、計畫懷孕、要哺乳的婦女，患有肝功能不全、患有肺部疾病如氣喘、慢性支氣管炎、肺氣腫或糖尿病等其他病史，請告知您的醫師。

6. 請告知您的醫師和您現在服用的所有藥品，包含處方或非處方的用藥。

7. 沒有醫師指示，不可自行停藥或調整劑量。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

視力模糊、排尿困難、重心不穩、呼吸緩慢、呼吸困難、嚴重的情緒變化過快。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

便秘、持續性頭痛、頭暈、嗜睡、噁心、嘔吐、胃痛、出疹。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2022/8/4 修訂】

BTC00EQ05-02