

Ketorolac tromethamine 眼用製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	規格
Ketorolac tromethamine	Kelac oph soln	舒腫眼藥水	0.5% ; 5 毫升/瓶

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 為止痛消炎眼藥水，可暫時緩解由季節性過敏性結膜炎引發之眼部搔癢，或用於緩解白內障手術後之眼部發炎。

◆ **用量與用法：**

1. 先將手洗淨擦乾。
2. 打開瓶蓋，頭部往後仰或平躺。
3. 一手手指置於眼睛正下方之臉頰處，輕輕下拉下眼瞼，使眼球及眼瞼分開形成一個眼窩。以另一手拇指及中指握住藥水瓶並朝下，將眼藥水點在眼窩穹窿內。一次投予一滴或依醫師指示的藥量投予，注意瓶嘴不要接觸到睫毛或眼睛，以防藥水瓶受到污染。
4. 閉上眼睛，同時用手指頭壓住兩鼻側淚管開口 3~5 分鐘。
5. 用畢，蓋上瓶蓋，若有流至眼睛周圍之眼藥水或淚水可用紙巾擦拭乾淨，使用後再洗手。
6. 若需點兩種以上眼藥水時，請相隔 5 分鐘以上再重複上述步驟點第二種眼藥水。若同時使用眼藥膏，眼藥膏後點。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥任一成分或其他非類固醇消炎止痛藥(NSAID)過敏者。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存於室溫 25°C 以下陰涼處，避免陽光直射。
2. 開瓶後最多只能存放一個月，逾時請丟棄。不用時請將瓶蓋關緊。
3. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人使用。

◆ **注意事項：**

1. 若同時使用二種以上眼藥水，請相隔 5 分鐘使用。若併用眼藥膏，眼藥水點完後隔 10 分鐘再使用眼藥膏。
2. 本品含 benzalkonium chloride 防腐劑，可能會對眼睛造成刺激及造成軟式隱形眼鏡變色，點藥前需取下隱型眼鏡，並等待至少 30 分鐘後再戴上。
3. 用藥後可能會有短暫的視力模糊，駕車或進行危險性工作時，應格外謹慎。
4. 有出血傾向或接受其他可能延長出血時間藥物者，請先告知醫師。

◆ **可能引起的副作用：**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
 - 嚴重過敏反應。
 - 眼出血。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
暫時性的眼部針刺感與燒灼感、眼部刺激、眼部淺層感染、角膜表面發炎、視力模糊。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/11/16 修訂】

BTC00EV45-02