

Acamprosate calcium 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Acamprosate calcium	Alglutol® DR tab	戒酒妥腸溶錠	333mg/tab

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
用於協助酒精依賴者在治療初期保持戒酒，可以降低酒癮者飲酒的慾望。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 使用之劑量因病及因人而異，請遵循醫師指示服用，勿自行增加、減少或突然停藥。
 2. 本品為緩釋的腸溶膜衣劑型，應整粒配水吞服，勿剝半、磨碎或咀嚼藥錠。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 對本藥或其賦形劑過敏者。
 2. 重度腎功能不全者(肌酸酐清除率 \leq 30 毫升/分鐘)。
 3. 本品含鈣，高血鈣者避免長期過量使用。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲存環境：室溫 25°C 以下儲存，避光、避濕及避熱。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 服藥期間應避免飲酒。
 2. 服用本藥無法消除或減少戒斷症狀，若再度飲酒，請告知您的醫師。
 3. 服用此藥的病患可能有較高的風險會產生自殺的想法或行為。對於過去曾有過這些想法與行為的人，風險會更高。若情緒或行為產生變化或較以往更為嚴重、出現自殺的想法或行為，請立即回診。
 4. 服用本藥可能會讓您想睡，駕車、操作機械或從事需專注力的活動時，請小心。
 5. 懷孕或計畫懷孕、哺乳、腎功能異常，請先告知醫師。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
 - 嚴重過敏：癢或蕁麻疹、臉或手腫脹、嘴或喉嚨腫脹或刺痛、胸悶、呼吸困難。
 - 沮喪或不正常的思想和行為、自殺傾向。
 - 腎功能異常：排尿量減少或頻率降低、體重突然增加、水腫。
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

頭痛、腹痛、背痛、心悸、噁心、嘔吐、消化不良、便秘、食慾增加、肌痛、嗜睡、性功能異常。