

Rivaroxaban 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Rivaroxaban	Xarelto® film-coated tablets	拜瑞妥膜衣錠	2.5 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
與乙醯水楊酸(阿斯匹靈；ASA)併用，可用於發生缺血事件高危險群之冠狀動脈疾病(CAD)或症狀性周邊動脈疾病(PAD)病人，以預防動脈粥狀硬化血栓形成事件(atherothrombotic events)。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 請遵循醫師指示使用，切勿自行更改廠牌、藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
 2. Xarelto 2.5 毫克可餐前或餐後服用。
 3. 無法吞服整粒藥錠的病人，本品可磨碎後與水或流質食物(如蘋果泥)混和後立即服用。
 4. 本品亦可磨碎後經由胃管給藥，胃管應於給藥前裝置完成，本品經由胃管給藥時，應搭配少量水並於給藥後用水沖洗胃管。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 對本藥任一成分過敏者。
 2. 正在嚴重出血的病人。
 3. 凝血功能異常和會導致出血風險的肝病患者。
 4. 孕婦或授乳婦。
 5. 嚴重腎功能受損(肌酸酐廓清率小於 15 毫升/分鐘)。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
 1. 不同的適應症有不同的處理方式請諮詢醫師或藥師。
 2. 每天一次：如果您錯過劑量或忘記使用藥物，同一天內想起請盡快使用。隔日想起請按時服用當日劑量即可，勿加倍劑量。
 3. 每天兩次：如果您錯過劑量或忘記使用藥物，應在下一個預定時間服用一次 2.5 mg 劑量；然後像往常一樣恢復治療，勿加倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲存在 30°C 以下，避光、避濕及避熱。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將藥送予他人使用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 進行包括神經軸麻醉或脊椎穿刺在內的背部醫療程序，本藥可能會增加血腫風險而導致神經損傷，請主動告知醫生正在服用本藥。若術後出現任何神經疾患的跡象，如背痛、麻木或刺痛感、肌肉虛弱無力、麻痺、大小便失禁，請立即停藥就醫。
 2. 如果必須接受侵入性手續或手術介入，可能的話基於醫師臨床判斷於該治療至少 12 小時前停用 Xarelto 2.5 毫克。
 3. 服用本藥後較容易出血，宜避免從事易引起受傷之運動或活動；建議使用軟毛牙刷及電動刮鬍刀，避免用力挖鼻孔或擤鼻涕。
 4. 拜瑞妥含有乳糖，患有半乳糖不耐症、Lapp 乳糖酶缺乏症或葡萄糖半乳糖吸收不良者，不應服用本藥。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150【2022/10/25 修訂】

Rivaroxaban 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Rivaroxaban	Xarelto® film-coated tablets	拜瑞妥膜衣錠	2.5 毫克/錠

5. 使用本藥前，若有下列事項請先告知醫師：懷孕或準備懷孕、哺乳、肝、腎臟疾病、出血問題、癌症、肺部疾病、有人工心臟瓣膜或抗磷脂症候群等。
6. 併有其他出血危險因子的病患，如先天性或後天性出血疾病、不受控制的嚴重動脈高血壓、活性期潰瘍性胃腸道疾病、新近的胃腸道潰瘍、視網膜血管病變、新近的顱內或腦內出血、脊椎或顱內血管異常、在大腦、脊椎或眼科手術後不久、支氣管擴張或肺出血等疾病，請小心使用。
7. 有使用任何藥物，包括處方藥、非處方藥，維生素和中草藥，尤其是抗生素、抗黴菌藥、非類固醇消炎止痛藥、精神科藥物(SSRI、SNRI)，請先告知醫師。
8. 長期服用本藥須定期至醫院就診及作例行性檢查，以作為醫師調整藥物的依據，並且可確保藥物療效及用藥安全。
9. 請勿在沒有詢問醫生的情況下突然停藥。

◆ **可能引起的副作用和發生時的處理方法：**

服用藥後副作用不常發生，但偶爾有

症狀	處理方法
<ul style="list-style-type: none"> - 過敏反應：搔癢、蕁麻疹、面部或手部腫脹、口腔或咽喉腫脹或刺痛、胸悶或呼吸困難。 - 出血現象：經血過多、血尿、血便或黑便、流鼻血、牙齦出血、瘀傷、嘔血。 - 背痛、麻木或刺痛感、肌肉虛弱無力、麻痺、大小便失禁。 	請停藥，並立即就醫
噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、便秘、頭暈、頭痛、發燒、虛弱、四肢疼痛、肝指數上升。	症狀嚴重或持續時，請告知醫師