

Propylthiouracil 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Propylthiouracil	Polupi®	僕樂彼錠®	50 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 治療甲狀腺機能亢進。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥品過敏者。

2. 曾因服用本藥後肝功能惡化者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 服用本藥品可能會降低身體的免疫力，接種任何疫苗前，請先與醫師討論。

2. 服用本藥可能會影響肝功能，服藥期間應注意急性肝功能惡化的症狀，如眼睛或皮膚變黃、茶色尿、食慾減退、噁心、嘔吐、腸胃不適，如發生請回診就醫。

3. 本藥品有引起顆粒性白血球減少症之副作用，若使用後有發燒與喉嚨痛的症狀，請立即停藥回診，確定是否有此類不良反應之發生。

4. 懷孕及計畫懷孕的婦女請先告知醫師。

5. 本藥可能經母乳分泌，授乳中的婦女請先告知醫師。

6. 若有正在服用碘或碘化物製劑、強心劑、抗凝血藥、抗心律不整藥、乙型交感神經抑制劑等，請告知您的醫師。

7. 沒有醫師指示，不可自行停藥或調整劑量。

8. 服用本藥須定期至醫院就診及檢查，以作為醫師調整藥物的依據，並且可確保藥物療效及用藥安全。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

持續或嚴重的發冷或發燒、虛弱、關節紅腫痛、喉嚨發炎、呼吸急促、眼睛或皮膚變黃。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

短暫或較不嚴重的發燒、出血或淤血的情形增加、皮膚疹、淋巴結或唾液腺腫。

頭痛、疲倦、味覺異常、噁心、嘔吐、下痢、食慾不振。