

## Salbutamol Sulfate 吸入製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Salbutamol sulfate	Saldolin® inh.	舒德林吸入液	5 毫克/2.5 毫升/支

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)  
可以擴張支氣管改善呼吸問題，用於治療支氣管痙攣、急性嚴重性氣喘。

◆ **用量與用法：**

1. 只可透過氣霧器將此藥液吸入肺部，不可口服或注射。
2. 市面上有數種氣霧器，使用前請詳閱說明書，依說明書之操作步驟來使用及清潔。
3. 藥物放入氣霧器之儲藥杯可以不加稀釋液稀釋，若需稀釋，請依醫師指示加入適當的稀釋液至適當的濃度及體積(通常是加生理食鹽水至總體積為 4-5ml)。
4. 非一次性使用之儲藥杯及氣霧器零件，每次使用完畢應以無菌水或蒸餾水沖洗乾淨並自然風乾，以降低感染風險。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本品之任一成分過敏者。
2. 不能用於制止無併發症之早產或強迫性流產。

◆ **忘記用藥時該如何處理？**

想起時儘快使用；若接近下次用藥時間，按時使用下次劑量即可，不可使用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 存放於攝氏 30°C 以下陰涼處，避免陽光直射、遠離濕氣及過熱的地方。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 與其它吸入劑相同，本藥可能反常性的引起支氣管痙攣，若發生喘、呼吸困難，請立即停藥就醫。
2. 應避免藥液噴到眼睛，曾有個案因噴到眼睛發生散瞳、眼內壓增加、狹角性青光眼、眼睛疼痛等。
3. 眼睛疼痛或不適、視力模糊、視野出現光暈或有色彩、伴隨因結膜充血而造成的紅眼及角膜水腫等，可能是急性狹角性青光眼的徵兆，若出現這些症狀請立即就醫。
4. 本藥可能罕見地引起心肌缺血，患有嚴重心臟疾病(如缺血性心臟疾病、心搏過速或嚴重心臟衰竭)者應小心使用，若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難等症狀請立即就醫。
5. 本藥含 salbutamol 成份可能會使物質濫用的檢驗，如運動員的禁藥檢測，呈陽性。
6. 控制不佳的糖尿病、最近發生心肌梗塞、嚴重心臟或血管病變、甲狀腺機能亢進、親鉻細胞瘤、可能罹患狹角性青光眼、前列腺肥大或膀胱頸阻塞，請先告知醫師。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2022/9/29 修訂】

BTC00EQ23-02

### Salbutamol Sulfate 吸入製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Salbutamol sulfate	Saldolin® inh.	舒德林吸入液	5 毫克/2.5 毫升/支

◆ **可能引起的副作用和發生時的處理方法：**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

- 嚴重過敏。
- 支氣管痙攣、喘、呼吸困難。
- 胸悶、胸痛、呼吸困難。
- 快速、劇烈或不規則的心跳。
- 眼睛疼痛、視力模糊、視覺有光暈或彩色影像

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

頭痛、頭暈、顫抖、心跳過速、口腔及喉嚨刺激、咳嗽、口乾、肌肉痙攣。