

## Latanoprostene bunod 眼用製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
latanoprostene bunod	Vyzulta®	博士倫凡視達眼用液劑	0.024%；5 毫升/瓶

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)  
用於治療青光眼或降低高眼壓。
- ◆ **使用方式：**
  1. 一天一次，一次一滴點眼，於晚間投藥可獲得最佳效果。
  2. 用藥頻率請勿超過一天一次，頻繁點藥可能會減弱降眼壓效果。
  3. 用藥步驟：
    - ↓ 使用前請先將手洗淨擦乾。
    - ↓ 打開瓶蓋，頭部往後仰或平躺。
    - ↓ 一手手指置於眼睛正下方之臉頰處，輕輕下拉下眼瞼，使眼球及眼瞼分開形成一個眼窩
    - ↓ 以另一手拇指及中指握住藥水瓶並朝下，將一滴眼藥水點在眼窩穹窿內。  
(注意：瓶嘴不要接觸到睫毛或眼睛，以防藥水瓶受到污染)
    - ↓ 閉上眼睛，同時用手指頭壓住兩鼻側淚管開口 3~5 分鐘。
    - ↓ 用畢，蓋上瓶蓋，若有流至眼睛周圍之眼藥水或淚水可用紙巾擦拭乾淨，使用後再洗手
    - ↓ 若需點兩種以上眼藥水時，請相隔 5 分鐘以上再重複上述步驟點第二種眼藥水。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**  
對本劑的任一成分過敏者。
- ◆ **忘記用藥時該如何處理？**  
盡可能在您想起時立刻補滴一個劑量，但若幾乎到了滴用下一個劑量的時間，那就略去錯過的劑量並恢復到定期的用藥時間表。千萬別為了補上錯過的劑量而使用雙倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
  1. 儲存環境：冷藏於 2-8°C，避光儲存。
  2. 開瓶使用後可儲存於室溫 25°C 以下，並於 8 個星期內用完，8 星期後未用畢請丟棄。
- ◆ **注意事項：**
  1. 點藥後可能會造成短暫的視力模糊，駕車或操作危險性機械者請小心。
  2. 若有佩戴隱形眼鏡，點眼前請先將隱形眼鏡取出，在點藥後 15 分鐘才可重新佩戴。
  3. 與其他眼用藥水需間隔至少五分鐘以上，眼用藥膏至少間隔十分鐘以上。
  4. 此藥可能會導致虹膜棕色素沉積，大多數案例的虹膜顏色變化都很輕微。在停藥後色素沉積不會繼續增加，但所造成之顏色改變可能是永久性。色素沉積不會造成不良果，可以繼續用藥，但應定期接受檢查並視臨床狀況考慮停藥。
  5. 曾有用藥後發生眼瞼皮膚變黑、睫毛變長、變厚、變黑、睫毛增多、亂序生長的情形，這些變化是可逆的，停藥後即會回復原貌。
  6. 無水晶體或人工水晶體植入的患者應小心，可能發生黃斑部水腫。
  7. 患有其他眼部狀況(如外傷或感染)、視力急速下滑、接受眼部手術，或發生任何眼部反應(角膜炎、角膜糜爛或不適刺癢持續不減)，應立即詢問其醫師是否應繼續使用。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問  
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150【2022/10/25 修訂】

### Latanoprostene bunod 眼用製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
latanoprostene bunod	Vyzulta®	博士倫凡視達眼用液劑	0.024%；5 毫升/瓶

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

發生全身性過敏、眼部感染加劇、哮喘加劇、虹膜色素沉澱或黃斑部水腫徵兆(如視力逐漸模糊)。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

眼睛或結膜充血、睫毛異常、眼睛不適刺激、異物感、疼痛及發癢。