

## Tropicamide 眼藥製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	規格
Tropicamide	Sintropic	露光點眼液	0.5% ; 5 毫升/瓶

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 眼睛檢查時，用於散瞳及睫狀肌麻痺。

◆ **用量與用法：**

1. 使用前請先將手洗淨擦乾。

2. 打開瓶蓋，頭部往後仰或平躺。

3. 一手手指置於眼睛正下方之臉頰處，輕輕下拉下眼瞼，使眼球及眼瞼分開形成一個眼窩。以另一手拇指及中指握住藥水瓶並朝下，將眼藥水點在眼窩穹窿內。一次投予一滴或依醫師指示的藥量投予，注意瓶嘴不要接觸到睫毛或眼睛，以防藥水瓶受到污染。

4. 閉上眼睛，同時用手指頭壓住兩鼻側淚管開口 3~5 分鐘。

5. 用畢，蓋上瓶蓋，若有流至眼睛周圍之眼藥水或淚水可用紙巾擦拭乾淨，使用後再洗手。

6. 若需點兩種以上眼藥水時，請相隔 5 分鐘以上再重複上述步驟點第二種眼藥水。若同時使用眼藥膏，眼藥膏後點。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥任一成分過敏者。

2. 已知或疑似房角狹窄性青光眼。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存於室溫 25°C 以下陰涼處，避免陽光直射。請勿置於冰箱或高溫處。儲存時瓶蓋蓋緊。

2. 開瓶後最多只能存放一個月，逾時請丟棄。

3. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人使用。

◆ **注意事項：**

1. 本品含 benzalkonium chloride 防腐劑，可能會對眼睛造成刺激及造成軟式隱形眼鏡變色，點藥前需取下隱型眼鏡，並等待至少 15 分鐘後再戴上。

1. 使用本藥後，對光會較敏感(畏光)，可戴太陽眼鏡減輕不適。

2. 用藥後可能會造成視線模糊與難以適應黑暗，於夜間駕駛時或於光線不佳處進行危險工作時，應格外謹慎。

3. 滴入眼睛後約 20~25 分鐘可達散瞳或睫狀肌麻痺的最大效果，5~6 小時後眼睛即可恢復正常。

4. 本藥可能造成眼壓升高，罹患青光眼的高危險群，如老年人、眼睛手術史、長期使用類固醇者，請小心使用。年輕高度近視、視網膜剝離史、前房急性發炎疾病、房水排出功能嚴重受損、角膜或結膜損傷者，請先告知醫師。

5. 本藥可能可能誘發精神病性反應及行為障礙，尤其是兒童，若有異常的情緒或行為出現，請立即就醫。

6. 有急性心臟衰竭、支氣管性氣喘、消化性潰瘍、甲狀腺功能亢進、胃腸道痙攣、巴金森氏

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2022/10/27 修訂】

BTC00EV47-02

### Tropicamide 眼藥製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	規格
Tropicamide	Sintropic	露光點眼液	0.5% ; 5 毫升/瓶

症、泌尿道阻塞、近期曾發生心肌梗塞、高血壓與低血壓病史者，請先告知醫師。

◆ **可能引起的副作用：**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

- 嚴重過敏反應。
- 視力改變、視野變暗或有黑影。
- 過量症狀：皮膚潮紅、黏膜乾燥、皮膚乾燥(兒童可能會出現皮疹)、視力模糊、快速與不規則的脈搏、發燒、嬰幼兒腹脹、抽搐、幻覺與神經肌肉協調性喪失。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

畏光、瞳孔縮小、視力模糊、眼部刺激、眼部充血、眼睛疼痛、閃光幻覺、頭痛、頭暈、噁心。