

Pimecrolimus 外用乳膏衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Pimecrolimus	Elidel®	醫立妥乳膏	1%；15 克/條

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

第二線使用於 3 個月以上兒童、青少年及成人異位性皮膚炎之短期及間歇性長期治療。

◆ **使用方式：**

1. 可使用於所有部位的皮膚，包括頭部、臉部、頸部及皮膚的皺摺處。
2. 僅可塗抹於皮膚患部，勿接觸嘴、鼻和眼睛（可引起灼傷）。
3. 每天使用兩次，例如：早上及晚上各擦一次。
4. 用藥步驟：
 - ↓ 洗淨及弄乾雙手。
 - ↓ 打開軟膏(第一次使用時必須用蓋子頂端的尖釘戳破軟管開口)。
 - ↓ 將乳膏擠壓於手指上。
 - ↓ 將一薄層的乳膏完全覆蓋於皮膚患部。
 - ↓ 輕輕地塗抹。
 - ↓ 把蓋子放回軟膏上。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

對 pimecrolimus 或本藥品賦形劑任一成分過敏者禁止使用。

◆ **忘記用藥時該如何處理？**

盡可能在您想起時立刻補擦一個劑量，但若幾乎到了使用下一個劑量的時間，那就略去錯過的劑量並恢復到定期的用藥時間表。千萬別為了補上錯過的劑量而使用雙倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：存放於 25°C 以下。
2. 本藥品必須於包裝上所印之有效期限內使用。

◆ **注意事項：**

1. 本藥品不應使用於患有急性皮膚病毒感染的部位。
2. 小心避免藥品接觸到眼睛和粘膜，若不慎接觸到這些部位，應立即用清水徹底沖洗。
3. 使用醫立妥乳膏，可能會在塗抹的部位引起輕微且短暫的反應，例如感覺溫熱/或灼熱的感覺，如果塗抹部位的反應很嚴重，應回診告知醫師。
4. 請勿在患處使用任何遮蓋物（例如繃帶、紗布），除非醫師另外指示。
5. 使用本藥品後，可以立即使用濕潤劑。然而，在洗澡後，濕潤劑應在本藥品前使用。
6. 長期治療異位性皮膚炎時，應在其第一個徵候及症狀出現時，即開始使用本藥品，以避免症狀惡化。
7. 只要症狀還沒消失，仍應每天塗抹本藥品兩次於患部。如果停藥後，萬一症狀再發，應在一發現時，即重新使用，以免症狀再惡化。
8. 如果疾病消退，應中止治療。
9. 如果在治療 6 週後情況沒有改善或病情惡化，則應停止使用本藥品並諮詢醫師。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150【2022/10/25 修訂】

BTC00EW23-02

Pimecrolimus 外用乳膏衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Pimecrolimus	Elidel®	醫立妥乳膏	1%；15 克/條

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
發生嚴重過敏反應。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
使用部位灼熱感、使用部位反應(刺激、搔癢、紅斑)、皮膚感染(毛囊炎)、症狀惡化。