

Spherical absorptive carbon 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Spherical absorptive carbon	Kremezin®	克裏美淨速崩錠	0.5 克/錠；4 錠/包

- ◆ **用途：**(一種藥可能有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
為尿素吸附劑，能將腸道內尿毒素吸附在特殊奈米孔徑內，再排出體外，可以改善尿毒症候群(如：食慾不好、噁心、口臭、搔癢)，延後透析開始時間。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 本品以少量的水即可崩解，請放入口中以水讓其崩解後吞服。
 2. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
 3. 本品具吸附性，請與其他藥品間隔 1 小時以上服用。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

若有以下情形，請勿自行服用

 1. 患有**消化道輸送失調(transit disorder)**的病人，克裏美淨速崩錠可能會干擾排泄。
 2. 必須使用口服特殊解毒劑者不可使用活性碳。
 3. 因腐蝕性物質引起之中毒者。
 4. 對本品任一成分過敏者。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 室溫 25°C 以下避免陽光直射的陰涼處。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 由於其對腐蝕性物質引起之中毒無效，因此，如確定是由腐蝕性物質引起之中毒，應避免使用本品。
 2. **當合併使用其他藥物**，在考量本產品為**吸附劑**的情況下，**不應同時使用**，請間隔 1 小時。
 3. 本藥可能會造成便秘或加重便秘情形，可多喝水、多吃高纖食物、適度運動來改善。
 4. 本藥不會被人體吸收並經胃腸道排出體外，會使您的糞便變黑，此為正常現象，但若黑便併有腹部絞痛、心灼熱、血便等其他症狀，請告知醫師。若有腸道阻塞等消化道輸送異常的病人，請勿使用。
 5. 患有**消化性潰瘍**或**食道靜脈曲張**的病人，在服用本產品時應小心注意。
(本產品是以固態狀態下經過消化道，可能會刺激經過區域)
 6. 有服用**避孕藥**、**肝臟病史**、**便秘者**，請先告知醫師。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
 1. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
便秘、黑便、腹瀉。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2023/02/01 修訂】

BTC00EA18-02