

Benzydamine 噴液劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Benzydamine HCl	Comfflam Forte®	康護寧加強消炎噴液劑	90 毫克/30 毫升/瓶

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
舒解口腔及咽喉疼痛，包括對下列疾病或症狀所引起的疼痛：扁桃腺炎、喉嚨痛、放射治療引起的黏膜炎、鵝口瘡潰瘍、口腔及牙周手術後的疼痛。
- ◆ **用量與用法：**
請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數。
使用方式：
 1. 依醫師指示之次數，直接噴液於疼痛紅腫之部位後緩慢吞服。
 2. 如有必要，每 1.5~3 小時可重複使用。清潔方式：使用後，用乾淨的面紙擦乾噴嘴以避免阻塞。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
對本藥或其賦形劑成分過敏者
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 6 歲以下之孩童，由於缺乏足夠的臨床經驗，除非醫師指示，否則不建議使用。
 2. 一般使用時不需稀釋，但若使用後發生灼熱或刺痛感時，可用開水漱口稀釋，減少不適的症狀。
 3. 除非在醫師指示之下，使用本品請勿連續使用 7 天以上。
 4. 懷孕或準備懷孕、哺乳，請告知醫師。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
過敏（皮膚搔癢、紅疹、蕁麻疹、日光性皮膚炎和喉痙攣或支氣管痙攣）。
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
口腔的麻木感、灼熱和刺痛感、乾燥或口渴、刺痛、口腔發熱、味覺改變。
噁心、嘔吐、反胃、胃腸功能失調，頭昏，頭痛和嗜睡。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2023/02/01 修訂】

BTC00EO01-02