

Acetylcysteine 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Acetylcysteine	Actein® tab	愛克痰發泡錠	600 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 減少呼吸道黏膜分泌物之粘稠性。
2. 緩解手術後肺部併發症引起之分泌物粘稠。
3. Acetaminophen (Depyretin®得百利寧錠)過量中毒的解毒劑。

◆ **用量與用法：**

1. 請以 60-100ml 水溶解，溶解後立即飲用。
2. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥或其所含賦形劑過敏者。
2. 本品含甜味劑(Aspartame)，苯酮尿症患者宜審慎使用。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 若服藥後症狀未改善或變差，請於回診時告知您的醫師。
2. 服用本藥時，患有支氣管哮喘的病人用藥要嚴格控制，出現支氣管痙攣時必須停用本藥。
3. 已懷孕或計畫懷孕、哺乳、氣喘、呼吸道疾病或對任何藥物過敏，請告知醫師。
4. 本藥可能有硫臭味，此為主成分特有味道，非產品變質，請放心使用。
5. 不建議將其他藥物和本藥品溶液混在一起。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
過敏現象(如呼吸困難、皮膚紅疹、支氣管痙攣)。皮疹伴或不伴發燒。劇烈或持續嘔吐。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
噁心、嘔吐、腹瀉、食慾不振。嘔吐或胃部不適。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2023/1/31 修訂】

BTC00EQ01-02