

Prednisolone acetate 眼用懸浮液衛教單張

學名	商品名	中文名	規格
Prednisolone acetate	Prednicone 1%	復眼康眼藥水	1%；5 毫升/瓶

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
1. 為類固醇製劑，用於治療眼部的發炎性疾病，如眼瞼炎，結膜炎，角膜炎，鞏膜炎，虹彩毛樣體炎等過敏性疾患。
- ◆ **用量與用法：**
1. 先將手洗淨擦乾。
 2. 使用前請先將眼藥水搖勻，打開瓶蓋，頭部往後仰或平躺。
 3. 一手手指置於眼睛正下方之臉頰處，輕輕下拉下眼瞼，使眼球及眼瞼分開形成一個眼窩。以另一手拇指及中指握住藥水瓶並朝下，將眼藥水點在眼窩穹窿內。一次投予一滴或依醫師指示的藥量投予，注意瓶嘴不要接觸到睫毛或眼睛，以防藥水瓶受到污染。
 4. 閉上眼睛，同時用手指頭壓住兩鼻側淚管開口 3~5 分鐘。
 5. 用畢，蓋上瓶蓋，若有流至眼睛周圍之眼藥水或淚水可用紙巾擦拭乾淨，使用後再洗手。
 6. 若需同時點其他眼藥水時，本藥需後點，前項藥水用畢後隔 5 分鐘以上再依上述步驟點易控炎眼藥水。若同時使用眼藥膏，眼藥膏後點。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
1. 對本藥任一成分或其他類固醇過敏者。
 2. 病毒感染的角膜炎或結膜炎、單純性疱疹、水痘、牛痘、黴菌或真菌感染的眼疾。
- ◆ **藥品儲存：**
1. 儲存於室溫 25°C 以下陰涼處，避免陽光直射。
 2. 開瓶後最多只能存放一個月，逾時請丟棄。不用時請將瓶蓋關緊。
 3. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人使用。
- ◆ **注意事項：**
1. 本品為懸浮液劑型，使用前請先搖勻，若併用其他眼藥水，眼藥水點完後隔 5 分鐘再使用本品。若併用眼藥膏，本品點完後隔 10 分鐘再使用眼藥膏。
 2. 本品含 benzalkonium chloride 防腐劑，可能會對眼睛造成刺激及造成軟式隱形眼鏡變色，點藥前需取下隱型眼鏡，並等待至少 30 分鐘後再戴上。
 3. 用藥後可能會有短暫的視力模糊，駕車或進行危險性工作時，應格外謹慎。
 4. 長期使用此藥可能增大罹患白內障、青光眼或眼部感染的風險，請定期回診眼科檢查。
 5. 請依照醫師指示使用，勿超過醫師指示的時間長度。若使用 2 天後症狀未減輕，請回診請醫師重新評估。
 6. 本品原則上不使用於病毒、結核菌、黴菌或真菌感染引發的炎症，請經醫師診治後再使用，勿自行使用。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2022/11/23 修訂】

BTC00EV24-02

Prednisolone acetate 眼用懸浮液衛教單張

學名	商品名	中文名	規格
Prednisolone acetate	Prednicone 1%	復眼康眼藥水	1%；5 毫升/瓶

◆ 可能引起的副作用：

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
 - 嚴重過敏反應。
 - 視力改變、眼睛疼痛或嚴重眼睛刺激。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
眼睛刺激、灼熱或刺痛、視力模糊、眼中異物感、味覺改變。