

Perampanel 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Perampanel	Fycopma	癲控達膜衣錠	2 毫克/錠劑
	Fycopma susp	癲控達口服懸液劑	0.5 毫克/毫升；340 毫升/瓶

◆ **用途：**（一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡）

1. 控制局部癲癇發作與原發性全身性強直陣攣癲癇發作。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改廠牌、藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

2. 睡前單次服用，空腹或隨餐服用皆可。

3. 癲控達膜衣錠不可咀嚼、壓碎或剝半服用，應整粒吞服。


4. 癲控達口服懸液劑：

(1) 第一次使用請將所附的藥瓶轉接器裝入瓶口至緊密密合為止。藥瓶轉接器保持於瓶口，不用取下。

(2) 每次服用前請先振搖均勻至少 5 秒鐘

(3) 內附注射器量筒插入藥瓶轉接器後，將藥瓶倒置並從瓶中量取所需藥量。

(4) 每次服用後，瓶蓋應旋緊，並將注射器量筒之藥桶及柱塞分開，以洗潔劑清洗乾淨後陰乾(請勿以擦拭的方式乾燥注射器量筒)。



◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥或其賦形劑過敏者。

2. 癲控達膜衣錠含乳糖，因此患有半乳糖不耐症、Lapp 乳糖酵素缺乏症或葡萄糖-半乳糖吸收不良等不宜服用本品。

3. 癲控達口服懸液劑含山梨醇，因此患有果糖不耐症者不宜服用本品。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 忘記服藥時，略過一次，依照原訂給藥間距服藥，絕不可一次服用兩倍劑量。

2. 忘記服用多次劑量時請告知醫師。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 30°C 以下，避濕、避熱、避光。

2. 癲控達口服懸液劑開封後保存期限為 90 天，90 天後未用畢請丟棄。

3. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2023/04/26 修訂】

BTC00EG11-02

Perampanel 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Perampanel	Fycompa	癲控達膜衣錠	2 毫克/錠劑
	Fycompa susp	癲控達口服懸液劑	0.5 毫克/毫升；340 毫升/瓶

◆ 注意事項：

1. 服用本藥罕見地可能會發生嚴重精神和行為不良反應，包括攻擊性、敵意、易怒、憤怒和殺人想法及威脅，尤其是在劑量調整期間和高劑量時。家人及照顧者應監測患者的反應及情緒、行為或性格變化，如果出現這些症狀請告知醫師。
2. 使用本藥可能會引起頭暈和嗜睡，從事需要高度警覺性的活動時應謹慎，例如駕駛或操作危險性機器。
3. 可能會降低含黃體素之荷爾蒙避孕藥的效果，建議使用其他避孕方式，如子宮內避孕器、保險套等。
4. 服藥期間應避免飲用含酒精的飲料，以免增加中樞神經抑制的副作用。
5. 服用本藥可能會增加跌倒發生之風險，尤其是老年人，請特別注意預防跌倒。
6. 有使用任何藥物(包括處方藥、非處方藥、維他命、中草藥)請先告知醫師。特別是其他抗癲癇藥。
7. 沒有醫師指示，不可自行停藥或調整劑量。請遵循醫師指示以漸進方式停藥，進而降低癲癇復發之可能。
8. 若已懷孕、計畫懷孕、哺乳、抑鬱、自殺念頭或情緒問題、物質成癮等病史，請告知醫師。

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
 - 嚴重過敏：蕁麻疹；發癢；皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，而且有可能伴隨發燒；喘鳴；胸口或喉嚨緊繃；難以呼吸、吞嚥或說話困難；嗓音異常嘶啞；或嘴巴、臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。
 - 癲癇惡化。
 - 心律不整：緩慢、快速或不規則脈搏、心悸、呼吸短促、感覺頭暈或昏厥
 - 精神異常：幻覺、抑鬱、感到緊張、坐臥不寧或脾氣暴躁；恐慌症發作；自殺企圖或自殺意念。
 - 感染：嚴重無力、發燒、重複性感染、不明原因的淤傷或出血。
 - 過量徵狀：嗜睡、精神激昂、具攻擊性、意識障礙、呼吸抑制、昏迷。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

食慾增加或減退；焦慮、失眠、神經質；嗜睡、頭痛、眩暈、抽搐、震顫、平衡失調、跌倒；複視、視力模糊；噁心嘔吐、腹痛、腹瀉；無力感/倦怠；體重增加。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2023/04/26 修訂】

BTC00EG11-02