

Levetiracetam 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Levetiracetam	Keppra®	優閒膜衣錠	500 毫克/錠
	Keppra® solution	優閒內服液劑	100 毫克/毫升；300 毫升/瓶


- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
用於治療癲癇發作。

- ◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 可搭配或不搭配食物服用。

3. **優閒內服液劑：**

- (1) 第一次使用請將所附的塑膠接合器裝入瓶口，並將蓋子蓋回及旋緊以確保接合器完全往下推入瓶子頸部。塑膠接合器保持於瓶口，不用取下。
- (2) 以內附注射器量筒取用所需劑量。
- (3) 每次服用後，瓶蓋應旋緊，且以乾燥、乾淨的紙巾擦拭注射器外部。



- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本品主成份(levetiracetam)、其他 pyrrolidone 衍生物或任何賦形劑過敏者。

- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

- ◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 30°C 以下，避光、避濕及避熱。
2. 優閒內服液劑開封後有效期限為 2 個月，2 個月後未用畢請丟棄。
3. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

- ◆ **注意事項：**

1. 服用本藥後可能會引起困倦或影響動作協調平衡能力，尤其是在治療初期或增加服藥量時。開車、操作機械或從事危險性高的動作時應小心謹慎，直到確認此藥對您沒有影響。
2. 極少數案例在使用此藥後發生血球細胞量減少，一般發生於治療初期，若發生嚴重無力、發燒、重複性感染或凝血障礙時，請立即回診。
3. 如同其他用於治療癲癇發作的藥物，此藥物可能有輕微增加憂鬱、自殺想法或行為的風險。若出現任何徵兆，如抑鬱、感到緊張、坐臥不寧或脾氣暴躁；恐慌症發作；情緒或行為出現其他變化，請告知醫師。
4. 本藥可能罕見地會引起精神病症狀及行為異常，包括易怒及攻擊性，兒童比成人發生率高。若出現重大的情緒變化、性格變化、異常的攻擊行為，請告知醫師。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/12/20 修訂】

Levetiracetam 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Levetiracetam	Keppra®	優閒膜衣錠	500 毫克/錠
	Keppra® solution	優閒內服液劑	100 毫克/毫升；300 毫升/瓶

5. 與其他類型的抗癲癇藥物一樣，本藥可能罕見地加劇癲癇發作的頻率或嚴重性，尤其是在開始使用或增加劑量後的第一個月內。如果發生癲癇惡化的情況，應立即回診。
6. 使用此藥後曾出現心跳異常(心電圖 QT 間隔延長)的病例，若有心律不整的症狀，如緩慢、快速或不規則脈搏、心悸、呼吸短促、感覺頭暈或昏厥，請立即就醫。
7. 若無醫師指示，請勿突然停藥，因為出現癲癇發作的風險可能增高。若需停藥，應按醫師指示逐步緩慢地減少劑量直至停用。
8. 已懷孕、計畫懷孕、哺乳婦、肝腎功能不全、心臟疾病史，請先告知醫師。

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
 - 嚴重過敏：蕁麻疹；發癢；皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，而且有可能伴隨發燒；喘鳴；胸口或喉嚨緊繃；難以呼吸、吞嚥或說話困難；嗓音異常嘶啞；或嘴巴、臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。
 - 癲癇惡化。
 - 心律不整：緩慢、快速或不規則脈搏、心悸、呼吸短促、感覺頭暈或昏厥
 - 精神異常：幻覺、抑鬱、感到緊張、坐臥不寧或脾氣暴躁；恐慌症發作；自殺企圖或自殺意念。
 - 感染：嚴重無力、發燒、重複性感染、不明原因的淤傷或出血。
 - 過量徵狀：嗜睡、精神激昂、具攻擊性、意識障礙、呼吸抑制、昏迷。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
 鼻咽炎、咳嗽；厭食；焦慮、失眠、神經質；嗜睡、頭痛、眩暈、抽搐、平衡失調、震顫；複視、視力模糊；噁心嘔吐、消化不良、腹痛、腹瀉；潮紅；無力感/倦怠。