

Bisacodyl 外用栓劑衛教單張

商品名	中文名
Bisadyl® supp.	秘瀉樂栓劑

◆ **組成：**

- 1 每顆含瀉劑 Bisacodyl 10 毫克。

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

- 1 暫時緩解便秘，診斷及手術前清腸。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數。

◆ **使用方式：**

1. 雙手洗淨擦乾。
2. 由指示處撕開栓劑外包裝，取出藥物。
3. 側躺，將上側膝蓋提起靠近胸部。上臀抬高露出肛門。栓劑較尖的一端朝前，用食指輕按栓劑之底部，再塞入肛門 2-3 公分處，越過肛門括約肌。
4. 用手捏住兩側臀肌，避免栓劑脫出。
5. 將手徹底洗乾淨。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥或其賦形劑成分過敏者
2. 患有腸胃道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心患者。
3. 嚴重脫水者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

- 1 想起時儘快使用；若接近下次用藥時間，按時使用下次劑量即可，不可使用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

- 1 室溫下避光、避濕及避熱，置於陰涼、陽光無法直射處保存。
- 2 將藥品放在孩童拿不到的地方，勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 使用本藥後，應待便意強度持續後再行排便，若使用後立即排便，可能將藥完全排空而導致失效。
2. 栓劑變形時，照原塑膠包裝形態，浸於溫水(40~50°C)中，軟化後再浸於冷水(20°C 以下)即可凝固。
3. 栓劑如軟化或溶化時，可浸於冷水(20°C 以下)即可凝固。
4. 本藥不應長期使用，一但排便正常，即應停藥。除非有醫師指示，不得連續使用一星期以上，同時應盡量以含纖維飲食，充份攝取水分及運動來改善便秘。
5. 若有血便及自發性直腸出血狀況，或使用一週無效後，應停藥立即就醫。
6. 6 歲以下兒童，未經醫師指示，請勿自行使用。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2023/4/20 修訂】

BTC00EK04-02

Bisacodyl 外用栓劑衛教單張

商品名	中文名
Bisadyl® supp.	秘瀉樂栓劑

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

嚴重過敏(蕁麻疹、臉部或手部腫脹、嘴唇或喉嚨腫脹、呼吸困難)、虛弱、暈眩、心悸、劇烈絞痛、血便或肛門出血。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

腸道過度活動(腹絞痛、腹瀉、打嗝、噁心)、肛門周圍有刺激感。