

Silymarin + multivitamins 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Silymarin + multivitamines	Poulican®	保利肝膠囊	S 70 毫克/膠囊

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
 1. 輔助治療慢性肝病、肝病變及脂肪肝。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 請遵循醫師指示使用，切勿自行更改藥量、頻次或服用過量。
 2. 本藥須由醫師處方使用。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 對本藥或其賦形劑過敏者。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
 1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲存環境：室溫 25°C 以下儲存，避光、避濕及避熱。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 本藥含有複方 B 群，服用後尿液呈現黃色是正常現象，請不必掛慮。
 2. 本藥服用後，若發生過敏或不適現象(如發疹、搔癢等)，請立即停藥並請教醫師或藥師。
 3. 服用本藥須定期至醫院就診及檢查，以作為醫師調整藥物的依據，並且可確保藥物療效及用藥安全。
 4. 若已懷孕、計畫懷孕、要哺乳的婦女、對藥物過敏等病史，請告知您的醫師。
 5. 請告知您的醫師您正在服用的處方和非處方的藥品，以減少藥物交互作用發生。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
 1. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
偶有噁心、嘔吐、腹脹、腹瀉、尿多。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2023/04/20 修訂】

BTC00EK19-02