

耐絞寧(NTG)舌下錠使用說明

一、藥物用途

緩解胸痛及心絞痛。

二、如何安全服藥

當急性心絞痛發作時將藥物含於舌下，不可嚼碎或整粒吞服，若用藥5分鐘後症狀無改善，請使用第二粒，於5分鐘後仍無效，請使用第三粒並馬上就醫。



三、注意事項

- 1.勿與含酒精的飲料併服，可能會引起低血壓。
- 2.服藥後可能會有頭暈、昏昏欲睡、警覺降低或視覺模糊等副作用，請避免開車及從事需要集中注意力的工作。
- 3.勿與威而鋼、威而壯、犀力士等藥品併用。
- 4.孕婦或授乳婦用藥前，請與醫師討論再使用。

四、藥品副作用

- 1.常見起立眩暈、頭痛、臉頸潮紅、心跳變快、噁心、嘔吐。
- 2.少見持續頭痛、視力模糊、口乾、皮膚紅疹。

五、藥物保存方法

- 1.藥品請存放於陰涼乾燥處，避光保存於室溫 15-30°C，避免存放冰箱冷藏櫃。
- 2.本藥容易揮發而失去藥效，應時常保持瓶蓋栓緊，並避免置於過熱或潮濕的場所。

3.耐絞寧舌下錠開瓶後保存期限為六個月，可在瓶身註明效期，若未開封，保存期限請依瓶身之期限。



參考資料:

林怡慧（2017）．急性心絞痛-耐絞寧舌下錠使用須知．恩主公醫訊，249，26-27。

諮詢電話02-26723456轉6660

行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院