

Budesonide/Formoterol rapihaler 吸入製劑衛教單張

商品名	中文名
Symbicort rapihaler	吸必擴氣化噴霧器

◆ 組成：

一次劑量含類固醇 Budesonide 160 微克(mcg)及支氣管擴張劑 Formoterol 4.5 微克(mcg)，每瓶含 120 次劑量。

◆ 用途：(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

氣喘及慢性阻塞性肺部疾病的治療

◆ 不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：

對本藥或其賦形劑成分過敏者。

◆ 用量與用法：

請遵循醫師指示使用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

使用方式：

第一次使用、超過一週未使用、或曾經掉落過，使用前請輕輕搖晃它 5 秒，並直立對空按壓 1 次，之後再輕輕搖晃它 5 秒，並再次對空按壓 1 次準備使用。

1. 每次使用前，上下搖晃吸入劑 5 秒使藥品充分混合。
2. 輕輕擠壓吸嘴蓋兩側並將其取下。
3. 將大拇指放在吸入器底部，食指放在頂部，使吸入器直立在嘴巴前方。
4. 往旁邊呼氣，將白色吸嘴放入口中對準喉嚨，確認嘴唇完整包覆吸嘴且瓶身保持直立。
5. 開始緩慢深深吸氣的同時按壓吸入器釋出藥液，保持穩定且深的吸氣動作。
6. 當吸完一次劑量時，須移開吸嘴，並閉氣 5~10 秒再呼氣。
7. 如果處方劑量超過 1 次，請於 30 秒至 1 分鐘後重複 3~6 步驟。
8. 隨後再用水漱口，並將蓋上吸嘴蓋，漱口水不要吞下。

清潔方式：

- 1 吸入器吸嘴每週至少清洗一次。
- 2 用乾淨的乾布或衛生紙擦拭吸嘴的內側和外側再蓋上吸嘴蓋；請勿將吸入器放入水中，或企圖拆開吸入器。

餘藥確認：

1. 吸入器頂部附有計數器，其上的箭頭指出吸入器中剩下多少劑量(噴)。
2. 箭頭進入黃色區域，表示剩下約 20 個劑量，此時應準備再次取得新的藥物。
3. 箭頭進入紅色區域，表示剩下 0 個劑量，請將其丟棄，即使仍能噴出藥液。



◆ 藥品儲存：

1. 室溫 30°C 以下，避光、避濕及避熱。不要冷凍。
2. 吸入器自鋁箔袋中取出後保存期限為 3 個月。建議於吸入器上標註開封日或丟棄日。
3. 請勿將本藥放在可能暴露於極熱或極冷的車內。
4. 即使容器是空的，也不要再在容器上戳孔或將其投入火中。
5. 將藥品放在孩童拿不到的地方，勿將此藥送予他人服用。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2023/8/9 修訂】

BTC00EQ19-02

Budesonide/Formoterol rapihaler 吸入製劑衛教單張

商品名	中文名
Symbicort rapihaler	吸必擴氣化噴霧器

◆ 忘記用藥時該如何處理？

想起時儘快使用；若接近下次用藥時間，按時使用下次劑量即可，不可使用兩倍劑量。

◆ 注意事項：

- 1 為減少口腔咽喉發生念珠菌感染機率，每次使用後應以水漱口。若口腔或喉嚨發紅或有白苔，請告知醫師。
- 2 要停止治療時，建議以逐漸降低劑量的方式停藥，而且不可突然停藥。
- 3 對罹患嚴重心臟疾病的患者，若出現胸痛或心臟病惡化的症狀，應立即停藥就醫。
- 4 若發生急性且快速惡化的呼吸困難時，應立即請教醫師。

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

- 嚴重過敏。
- 胸痛、胸悶、呼吸困難加劇。
- 皮膚顏色變化、容易瘀傷、肌肉無力、臉圓或浮腫。
- 眼痛或視力改變。
- 快速、劇烈或不均勻的心跳。
- 發燒、發冷、咳嗽、口咽痛、身體酸痛。
- 疲倦、虛弱、噁心、嘔吐、頭暈。
- 震顫、神經質。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

心悸、頭痛、顫抖、咽喉輕微刺激、咳嗽、嘶啞、口腔或喉嚨有瘡或白斑。