

Betamethasone disodium phosphate/Neomycin sulfate 點眼液衛教單張

學名	商品名	中文名	規格
Betamethasone disodium phosphate 0.1% Neomycin sulfate 0.35%	Eye Rinderon-A	眼科用臨得隆複合液	5 毫升/瓶

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 含類固醇與抗生素，類固醇可用於緩解眼部的發炎症狀，抗生素可用於預防及治療眼部細菌感染。

◆ **用量與用法：**

1. 先將手洗淨擦乾。
2. 打開瓶蓋，頭部往後仰或平躺。
3. 一手手指置於眼睛正下方之臉頰處，輕輕下拉下眼瞼，使眼球及眼瞼分開形成一個眼窩。以另一手拇指及中指握住藥水瓶並朝下，將眼藥水點在眼窩穹窿內。一次投予一滴或依醫師指示的藥量投予，注意瓶嘴不要接觸到睫毛或眼睛，以防藥水瓶受到污染。
4. 閉上眼睛，同時用手指頭壓住兩鼻側淚管開口 3~5 分鐘。
5. 用畢，蓋上瓶蓋，若有流至眼睛周圍之眼藥水或淚水可用紙巾擦拭乾淨，使用後再洗手。
6. 若需同時點其他眼藥水時，本藥需後點，前項藥水用畢後隔 5 分鐘以上再依上述步驟點臨得隆複合液。若同時使用眼藥膏，眼藥膏後點。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥任一成分或賦形劑過敏者。
2. 曾對 streptomycin、Kanamycin、Gentamicin、Fradiomycin 等胺基配醣體類抗生素或 Bacitracin 過敏者。
3. 角膜上皮剝離或角膜潰瘍者、病毒性結膜或角膜患者、結核性眼部及患、黴菌性眼部及患、鼻腔結核性或病毒性疾患，未經醫師指示不宜使用，若使用需注意惡化症狀。

◆ **藥品儲存：**

1. 未開瓶需冷藏，儲存於 2-8°C。
2. 開瓶後則放於室溫下儲存，只能存放一個月，逾時請丟棄。不用時請栓緊瓶蓋。
3. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人使用。

◆ **注意事項：**

1. 若併用其他眼藥水，眼藥水點完後隔 5 分鐘再使用本品。若併用眼藥膏，本品點完後隔 10 分鐘再使用眼藥膏。
2. 眼部感染時不應配戴隱形眼鏡，如需配戴，點藥前需取下隱型眼鏡，並等待至少 30 分鐘後再戴上。
3. 用藥後可能會有短暫的視力模糊，駕車或進行危險性工作時，應格外謹慎。
4. 長期使用此藥可能增大罹患白內障、青光眼或眼部感染的風險，請定期回診眼科檢查。
5. 請依照醫師指示使用，勿超過醫師指示的時間長度。若使用 2 天後症狀未減輕，請回診請醫師重新評估。
6. 本藥原則上不使用於病毒、結核菌、黴菌或真菌感染引發的炎症，請經醫師診治後再使

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2023/08/29 修訂】

BTC00EV26-02

Betamethasone disodium phosphate/Neomycin sulfate 點眼液衛教單張

學名	商品名	中文名	規格
Betamethasone disodium phosphate 0.1% Neomycin sulfate 0.35%	Eye Rinderon-A	眼科用臨得隆複合液	5 毫升/瓶

用，勿自行使用。

◆ **可能引起的副作用：**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
 - 嚴重過敏反應。
 - 視力改變、眼睛疼痛或嚴重眼睛刺激。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
眼睛刺激、灼熱或刺痛、視力模糊、延遲創傷癒合。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2023/08/29 修訂】

BTC00EV26-02