

Azithromycin 口服液劑衛教單張

| 學名 | 商品名 | 中文名 | 含量/劑型 |
|--------------|---------------------------|---------|----------|
| Azithromycin | Azithrom [®] POS | 菌巴達懸液用粉 | 40 毫克/毫升 |

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
革蘭氏陽性、陰性及厭氧菌引起之下呼吸道感染(包括支氣管炎及肺炎)、皮膚及軟組織感染、中耳炎、上呼吸道感染和性傳染病。
- ◆ **不宜使用本藥的情形(使用禁忌)：**
對本藥或任一巨環黴素(Macrolide，如紅黴素)抗生素過敏者。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
 2. 請先加水配製成懸浮液後服用，勿直接服用乾粉。
- ◆ **配製方法：**
 1. 使用前請先搖動裝有粉劑的藥瓶。
 2. 開啟瓶蓋。
 3. 以內附針筒吸取 9ml 冷開水並加入，充分與藥粉混合均後即可使用。(加水溶解後每瓶可供取用 15ml 劑量，剩餘量請丟棄)
 4. 每次使用前請充份搖勻，以針筒吸取醫師指示藥量，再以所附針筒或湯匙餵食。
 5. 若處方之藥量為 2 瓶以上時，請一瓶使用完後再泡製另外一瓶。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **儲存方式：**
 1. 乾粉製劑保存於陰涼乾燥處(25°C 以下)，可存放至藥品包裝標示之有效期限。
 2. 配製後的懸浮液應貯存於陰涼、陽光無法直射的地方，泡製後的口服懸浮液在室溫下可保持穩定 10 天；若於 5 天後有未用完部份，請丟棄。
- ◆ **注意事項：**
 1. 每次使用前請充份搖勻後再服用。
 2. 每 5 毫升的泡製後懸浮液含有 3.87 克蔗糖，因葡萄糖半乳糖吸收不良或蔗糖酶-異麥芽糖酶缺乏症而罹患罕見之先天果糖不耐症患者，應避免使用。
 3. 服用本藥，可能會有輕微腹瀉情形發生，若症狀持續或嚴重時，請回診並告知醫師，不可自行使用止瀉藥。
 4. 服用本藥如有懷孕、準備懷孕、哺乳、肝腎功能疾病、心臟疾病、心律不整，請告知醫師。
 5. 治療期間若無醫師指示，請勿自行停藥，即使是感染症狀已消失，也應繼續服藥，直到整個療程結束，以避免抗藥性產生。
 6. 接受本藥治療後，如有任何疑問或不適(如心跳不正常、呼吸困難、胸痛、頭暈等症狀)，應儘速回診洽詢開立處方之醫師，不可自行停藥。
 7. 使用 azithromycin 亦可能罕見地引發嚴重的皮膚過敏反應：
 - (1) 服用 azithromycin 後出現皮膚疹或皮膚反應時應立即就醫。
 - (2) 曾因使用 azithromycin 引發嚴重皮膚過敏反應，應避免再次使用該藥品，建議與醫療人員討

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2023/10/05 修訂】

BTC00ET02-02

Azithromycin 口服液劑衛教單張

| 學名 | 商品名 | 中文名 | 含量/劑型 |
|--------------|---------------------------|---------|----------|
| Azithromycin | Azithrom [®] POS | 菌巴達懸液用粉 | 40 毫克/毫升 |

論改用其他抗生素藥品替代。

◆ **可能引起的副作用和發生時的處理：**

服用藥後副作用不常發生，但偶爾有

| 症狀 | 處理方法 |
|---|----------------|
| -嚴重過敏：皮疹、蕁麻疹、吞嚥困難、呼吸困難。皮膚或黏膜腫脹、起泡或脫皮(無論是否發燒)。 -胸痛或胸悶、心動過速或心跳異常。 -尿液變深、皮膚或眼睛顏色變黃。 -胃痛、痙攣或嚴重稀便、水便甚至出現血便。 | 請停藥，並立即就醫 |
| 噁心、嘔吐、頭痛、腹瀉。 | 症狀嚴重或持續時，請告知醫師 |

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2023/10/05 修訂】

BTC00ET02-02