

## Nefopam 口服製劑衛教單張

| 學名      | 商品名     | 中文名   | 含量/劑型   |
|---------|---------|-------|---------|
| Nefopam | Capain® | 痛定膜衣錠 | 30 毫克/錠 |

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
  1. 鎮痛。
- ◆ **用量與用法：**
  1. 通常一日三次經口服給予。
  2. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
  1. 有暈厥症病史者。
  2. 心肌梗塞之患者。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
  1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
  1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。
  2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
  1. 可能引發頭暈，應小心從事需要精神警覺性的活動，例如駕駛(包括開車)或操作危險的機器。
  2. 有青光眼、尿滯留、肝腎功能障礙、近期心臟病發作者，請先告知醫師。
  3. 正在服用治療憂鬱症藥物或帕金森氏症的藥物，例如 monoamine oxidase 單胺氧化酶抑制劑，請先告知醫師。
  4. 雖在動物試驗尚未發現畸胎，但於妊娠前三個月內使用時宜謹慎；人類哺乳期使用本藥品之資料尚缺乏，故使用前請先與醫師討論，衡量用藥優點及對母子所可能造成之損害。
  5. 十二歲以下兒童之安全性與療效尚未確立，未經醫師指示，請勿自行服用。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
  1. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師  
常見副作用為噁心、頭暈、倦睡、口乾，次為嘔吐、神經過敏、盜汗、失眠、心悸、口乾、尿滯留。
  2. 如發生以下症狀時，請立即就醫
    - 嚴重過敏：胸口或喉嚨緊繃；難以呼吸、吞嚥或說話困難。
    - 嚴重眩暈或失去知覺。