

Semaglutide 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Semaglutide	Rybelsus®	瑞倍適錠	3 毫克/錠
			7 毫克/錠
			14 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
 1. 搭配飲食及運動療法，用於治療血糖控制不良的第二型糖尿病成人病人，以改善血糖控制。
 2. 幫助體重減輕。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 應空腹搭配少量水(最多 120ml)整顆吞服，不應剝開、壓碎或咀嚼。
 2. 服藥後應等待至少 30 分鐘再進食、喝水或服用其他口服藥物。等待時間少於 30 分鐘會降低 semaglutide 的吸收，且空腹時間越久，吸收率越高。
 3. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 本身或家族有髓質甲狀腺癌病史，或罹患第二型多發性內分泌腫瘤症候群。
 2. 對本藥任一成分過敏者。
 3. 不應用於第一型糖尿病病人或治療糖尿病酮酸中毒。
 4. 懷孕、哺乳期間不應使用。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**

如果漏掉一劑，則應跳過，第二天再服用下一劑。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲存環境：室溫 30°C 以下，避光、避濕及避熱。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 懷孕、哺乳期間不應使用。建議有生育能力的女性在接受 semaglutide 治療時，需採用避孕措施，且應在計畫懷孕前停用 semaglutide 至少 2 個月。
 2. 未曾針對有胰臟炎病史的病人進行研究，有胰臟炎病史的病人不建議服用此藥。
 3. 與磺醯脲類藥物或胰島素併用時可能增加低血糖風險，在駕駛或操作機械時應小心，注意避免低血糖發生。
 4. 噁心、嘔吐、腹瀉等胃腸道副作用可能導致脫水，通常會隨時間或降低劑量而緩解，若發生腸胃道副作用應注意補充水分，避免體液不足。
 5. 本藥罕見地曾發生急性腎損傷和慢性腎功能衰竭惡化，尤其是出現噁心、嘔吐、腹瀉或脫水等嚴重胃腸道不良反應症狀的病人，若有上述症狀應注意補充水分並告知醫師。
 6. 有糖尿病視網膜病變病史的病人，服用本藥應密切監測視網膜病變是否惡化。
 7. 本藥會延緩胃部排空，可能影響其他口服藥物的吸收。

Semaglutide 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Semaglutide	Rybelsus®	瑞倍適錠	3 毫克/錠
			7 毫克/錠
			14 毫克/錠

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

- 嚴重過敏反應：血管性水腫、蕁麻疹、呼吸困難
- 急性胰臟炎：嚴重胃痛、嚴重背痛或嚴重胃部不適或嘔吐。
- 腎臟問題：無法排尿、排尿量改變、血尿或體重大幅增加。
- 膽囊問題：如右上腹部區域、右肩區域或肩胛骨之間的疼痛；大便改變；深色尿液、黃色皮膚或眼睛；或發燒伴有寒顫。
- 視力變化
- 嚴重低血糖
- 疑似甲狀腺腫瘤：頸部腫塊、吞嚥困難、呼吸困難、聲音持續沙啞。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

- 胃腸道副作用：噁心、嘔吐、腹瀉常見於治療的第一個月，通常症狀會隨著治療時間而減少消失

低血糖的處置：

1. 症狀：心跳加速、冒冷汗、頭昏眼花、飢餓、手抖等。
2. 處理方法：
 - ◇ 意識清醒者：立即服用 15 克醣類(方糖 3 顆或含糖飲料 120-150c.c 或一湯匙蜂蜜)，15 分鐘後再測血糖，若低於 70 請再補充一次，若症狀仍未改善，請立即送醫。
 - ◇ 意識不清者：切勿進食，立即送醫。