

Empagliflozin/Metformin HCl 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Empagliflozin + Metformin HCl	Jardiance Duo®	恩美糖膜衣錠	E 12.5 毫克+ M 850 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
適用於配合飲食和運動，改善第二型糖尿病成人病人的血糖控制。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 請遵循醫師指示使用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
 2. 服藥後若有腸胃不適副作用，請與食物一起服用。
 3. 藥錠請整粒吞服，可剝半，勿壓碎、弄碎或咀嚼。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 對本品任一成分或賦形劑過敏者。
 2. 重度腎功能不全 (eGFR 小於 30 mL/min/1.73 m²)，末期腎病或洗腎的病人。
 3. 急性或慢性代謝性酸中毒，包括糖尿病酮酸中毒，有或無伴隨昏迷。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲存環境：儲存於 30°C 以下。避光、避濕及避熱。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 服藥後可能會有低血壓的情形發生，尤其是老年人或腎臟功能不全的病人，請定期量測血壓並注意頭暈等低血壓症狀。
 2. 服用本藥若出現乳酸中毒症狀(如:全身乏力，肌痛，呼吸窘迫，嗜睡，腹痛等)或酮酸中毒症狀(如：噁心、嘔吐、腹痛、身體不適、呼吸急促)，請立即停藥就醫。
 3. 服用本藥可能會增加尿路感染或生殖器真菌感染的風險，如有頻尿、排尿困難、發燒、生殖器感染的症狀，請回診就醫。
 4. 請限制飲酒量。大量飲酒會增加乳酸酸中毒的風險。
 5. 有使用任何其他藥物(包括處方藥，非處方藥，維生素和草藥產品)，請告知醫師。
 6. 若已懷孕、計畫懷孕、哺乳、有肝、腎、腎上腺或垂體疾病、心衰竭、維生素 B12 缺乏症或胰腺疾病，請告知您的醫師。如果您正在低鹽飲食中，或正在接受外科手術或其他程序，請告訴您的醫師。
 7. 請告知任何治療您的醫生或牙醫您正在使用本藥。在進行外科手術，X 射線，CT 掃描或其他醫學檢查之前，可能需要停止使用本藥。
 8. 服用本藥須定期至醫院就診及檢查，以作為醫師調整藥物的依據，並且可確保藥物療效及用藥安全。
 9. 沒有醫師指示，不可自行停藥或調整劑量。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2023/11/14 修訂】

BTC00EM45-02

Empagliflozin/Metformin HCl 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Empagliflozin + Metformin HCl	Jardiance Duo®	恩美糖膜衣錠	E 12.5 毫克+ M 850 毫克/錠

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請停藥立即就醫

-嚴重過敏反應、呼吸急促或困難

-酮酸中毒：噁心、嘔吐、腹痛、身體不適、呼吸急促

-乳酸中毒：全身乏力，肌痛，呼吸窘迫，嗜睡，腹痛

-泌尿道或生殖器感染：頻尿、血尿、排尿困難、發燒、寒顫、下背或側面疼痛；(女)白帶或黃帶、陰道瘙癢或有異味；(男)陰莖發紅、發癢、疼痛或腫脹

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

低血壓、腹瀉、腹脹、頭痛、胃痛、噁心、嘔吐、鼻塞或流鼻涕、喉嚨痛、吃東西有金屬味。

3. 請注意低血糖現象：

症狀：虛弱、昏睡、昏亂、冒冷汗、顫抖、心悸、視力模糊、頭痛、飢餓等。

處理方法：立即吃含糖食物或飲料(糖果或果汁等)，若症狀未改善，則立即送急診。