

Estriol 陰道用製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Estriol	Esvatin Vaginal Tablets	薇詩婷陰道錠	0.5 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

陰道炎、子宮頸管炎及子宮腔部糜爛。

- ◆ **用量與用法：**

1. 本藥劑為塞入陰道內使用，請勿口服。應於晚間睡前置入陰道中。
2. 若還有月經，月經期間請暫時停藥。
3. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數。

使用方法：

↓ 雙手洗淨擦乾。

↓ 自鋁箔片取出陰道錠劑。

↓ 仰臥並將雙腿彎曲，以手指拿取陰道錠並塞入陰道深處(約 5 公分深度)。

◇ 置入陰道內後數分鐘內請保持躺姿，不要站起或走動，最好於睡前使用。

◇ 可在內褲底部墊衛生棉墊。

◇ 陰道嚴重乾澀者，為減少乾澀感可先將藥錠以溫水沾濕或用潤滑劑濕潤後再塞入

- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 受雌激素影響的惡性腫瘤(例如：乳癌、子宮內膜癌)及有此疑慮的患者(會促使腫瘤惡化或顯性化)。
2. 曾對本藥劑成分過敏的既往病症者。
3. 孕婦或疑似已懷孕的女性。

- ◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

- ◆ **忘記用藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快使用；若已超過 12 小時，則跳過錯過的劑量，按時使用下次劑量即可，千萬不可使用兩倍劑量

- ◆ **注意事項：**

1. 長期用藥者請定期進行乳房檢查和婦科檢查。
2. 此藥物可能會導致您臉上的皮膚出現暗斑。請避免日曬並適當的採用防曬措施。
3. 請勿吸煙並限制飲酒。
4. 若您需要長時間靜止不動，例如長途旅行、手術後或生病時需臥床靜養，請告知您的醫師。長時間不動會增大血液凝塊風險。

- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

- 休克、類過敏反應：出疹、潮紅、呼吸困難、血壓降低

- 血栓：胸痛或胸悶；咳血；呼吸短促、單腿或單臂腫脹、發熱、麻木、膚色改變或疼痛；

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2020/6/2 修訂】

BTC00EM47-02

Estriol 陰道用製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Estriol	Esvatin Vaginal Tablets	薇詩婷陰道錠	0.5 毫克/錠

或說話困難或呼吸困難

-乳房中有腫塊、乳房疼痛或脹痛或乳頭分泌物

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

陰道刺激、陰道出血或斑點、乳房觸痛或乳房緊脹感。



藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2020/6/2 修訂】

BTC00EM47-02