

**Omidenepag isopropyl 口服製劑衛教單張**

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Omidenepag isopropyl	EYBELIS®	愛倍力點眼液	0.002%；2.5 毫升/瓶

◆ **用途：**（一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡）

1. 治療隅角開放性青光眼及高眼壓症。

◆ **用量與用法：**

1. 一天一次，一次一滴點眼，建議在晚上用藥。

2. 用藥頻率請勿超過一天一次。

3. 用藥步驟：

↓ 使用前請先將手洗淨擦乾。

↓ 打開瓶蓋，頭部往後仰或平躺。

↓ 一手手指置於眼睛正下方之臉頰處，輕輕下拉下眼瞼，使眼球及眼瞼分開形成一個眼窩

↓ 以另一手拇指及中指握住藥水瓶並朝下，將一滴眼藥水點在眼窩穹窿內。

（注意：瓶嘴不要接觸到睫毛或眼睛，以防藥水瓶受到污染）

↓ 閉上眼睛，同時用手指頭壓住兩鼻側淚管開口 3~5 分鐘。

↓ 用畢，蓋上瓶蓋，若有流至眼睛周圍之眼藥水或淚水可用紙巾擦拭乾淨，使用後再洗手

↓ 若需點兩種以上眼藥水時，請相隔 5 分鐘以上再重複上述步驟點第二種眼藥水。

4. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本劑的任一成分過敏者。

2. 眼睛無水晶體或曾植入人工水晶體(IOL)的病人。

3. 與 tafluprost 合併使用。

◆ **忘記用藥時該如何處理？**

1. 若忘記用藥，請以原定下次給藥時間用藥，劑量不可超過每天於每側患眼一滴。

◆ **藥品儲存：**

1. 未開封冷藏於 2-8°C，避光儲存。

2. 開封後可於室溫 30°C 以下保存 1 個月。

3. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 點藥後可能會發生暫時性視力模糊或畏光，在症狀消失前不可駕駛或操作機械。

2. 若有佩戴隱形眼鏡，點眼前請先將隱形眼鏡取出，在點藥後 15 分鐘才可重新佩戴。

3. 與其他眼用藥水需間隔至少五分鐘以上，眼用藥膏至少間隔十分鐘以上。

4. 用於患有活動性眼部發炎的病人時需謹慎小心，可能導致眼部發炎惡化。

5. 使用本品可能發生黃斑部水腫(包括黃斑部囊樣水腫)以及虹膜炎。若發生如視力惡化的異常現象時，應立即向醫療專業人員諮詢。

6. 本品不應與 tafluprost 合併使用。本品與其他青光眼/高眼壓藥物合併使用可能增加眼部不良反應發生率，與其他青光眼/高眼壓藥物合併使用時必須謹慎小心。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2023/10/26 修訂】

BTC00EV49-02

**Omidenepag isopropyl** 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Omidenepag isopropyl	EYBELIS®	愛倍力點眼液	0.002%；2.5 毫升/瓶

7. 眼睛色澤可能變成棕色，這可能會是長期性的變化。眼睛色澤可能在開始使用此藥數月至數年後出現變化。若眼睛色澤產生變化，請聯絡醫師。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

嚴重過敏反應、視力惡化、視力受損、眼睛或眼皮腫脹、眼睛泛紅、眼睛疼痛或嚴重眼睛刺激、對明亮的光線很敏感、頭痛、虹膜炎、黃斑部水腫徵兆(如視力逐漸模糊)。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

結膜充血、眼睛不適刺激。