

化療藥物注射期間管路之注意事項

化學治療的外滲(Extravasation)是取決於化療藥物的種類及濃度，一旦發生化療藥物外滲時細胞毒性藥物會腐蝕皮膚組織，輕度傷害會造成表皮發紅、水泡，中度傷害則會因為組織壞死到影響日常生活，重度傷害會出現管路感染導致敗血性休克、氣胸及周圍器官不可逆之受損。

管路之注意事項



請勿自行調整機器，若有發出聲響時請立刻通知護理人員，以免影響藥物作用。



當翻身、起身下床活動需留意管路通暢勿扭折，若不慎拉扯到管路，請立即通知護理師確認人工血管位置的正確性。



注射化療藥物前應先上廁所，減少因下床如廁造成化療藥物外滲的危險性。



化療藥物輸注期間應暫時臥床休息、避免離開病房，以免因過度活動而增加外滲之危險性。



隨時觀察注射部位變化，若若有灼熱、疼痛、腫脹、發紅或任何異常感受需立即告知護理人員處理。

化療外滲藥物之不同，依醫囑給予冰敷或熱敷一天四次，每次 20 鐘，持續 24~48 小時。

參考資料：

高玉鳳、李淑慧、侯宜均（2021）．降低腫瘤科病房使用人工血管施行化療藥物外滲率之改善專案．*長庚科技學刊*，(34)，159-170。

吳美雯、林幸雅、曾信順等（2022）．以多團隊管理降低化學療法藥物外滲率改善專案．*醫院雜誌*，55（4），20-31。

張雅淳、王甄薇（2022）．降低化療集中病房化學治療藥物外滲率．*醫院雜誌*，55（1），43-54。

諮詢電話02-26723456轉6161

行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院