

週邊靜脈導管衛教指導

一、靜脈導管的目的：

1. 維持體液、電解質平衡。
2. 若由口攝取量不足時，供給所需。
3. 輸血或其他營養輸液給予。

二、週邊靜脈留置注射異常併發症：

靜脈炎、阻塞、液體滲漏等(如圖一、圖二)。



圖一 液體滲漏



圖二 靜脈炎

三、固定方式：

固定方法不得妨礙注射部位的觀察，注射部位的指(趾)端應露出以便觀察末梢循環(如圖三)。



圖三 注射部位的指(趾)端應露出

四、照護原則：

1. 維持點滴順暢，勿壓迫、扭曲或拉扯點滴管，並觀察輸液是否通暢、有無浸潤、紅腫、疼痛、滲濕、皮膚變色等情形(如圖四)。



圖四 觀察輸液是否通暢、有無浸潤

2. 任何活動時，切記勿拉扯管路、勿碰撞注射部位，以避免造成滑脫。
3. 勿自行調整滴數，以免影響藥物作用或造成心肺不適。
4. 保持留置針處清潔乾燥。
5. 至少每1-2小時可與另一側的手或腳做比較，確認注射部位是否有浸潤、紅腫、疼痛、滲濕、皮膚變色等現象(如圖五)



圖五 與對側比較

6. 若注射部位點滴外漏、點滴不順暢或不滴，應立即予以拔除。
7. 注射管路不慎鬆脫或滑落，請立即通知護理人員，切勿自行將脫落的管路接回。
8. 下床活動時，維持點滴高於注射部位至少90公分，保持點滴滴注順暢。

參考資料：

王玉琴、邱珮華、李佳心（2021）．運用可掀式固定套降低學齡前兒童靜脈注射之害怕行為．*志為護理－慈濟護理雜誌*，20(3)，106-116。

諮詢電話02-26723456轉6918. 6919

行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院