

耳用通氣管置入手術後注意事項

1. 手術後耳道不可以進水，需保持耳內乾燥，洗頭時可先塞耳塞於患耳，避免進水而可能造成感染。
2. 不可自行清除耳道分泌物，正常狀況下耳道無異味，如分泌物過多須返院由醫師清除。
3. 觀察聽力變化，如有異常須提早返院檢查。
4. 耳用通氣管一般可維持六到十二個月後自行脫落，若提早脫落須返院檢查。
5. 術後醫師如有開立『耳滴劑』請按指示使用。

★耳滴劑的使用方法：

- a. 檢查滴劑的滴嘴是否有破損，使用前先充分輕搖約十秒鐘。
- b. 若藥品附有滴管，將藥液吸至滴管並使滴管頭朝下，以側躺或傾斜之姿勢，將給藥的耳朵朝上，為使耳滴劑流入耳內，成人要將耳朵往後上方拉，3歲以下的小孩要往後下方拉。
- c. 將正確的藥量(1-2滴)滴入耳道，保持耳朵傾斜向上約5分鐘，使藥水停留在耳朵內。
- d. 遵從醫師指示按時服藥，若覺得傷口有問題或不適，可隨時掛號回門診檢查。

參考資料：

劉向援(2022)・手術全期護理之原則・於劉雪娥總校閱，內外科護理(八版，252-365 頁)・華杏

諮詢電話 02-26723456 轉 6526

行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院