

Guselkumab 注射筆 衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Guselkumab	Tremfya® Injection	特諾雅注射液	100 毫克/1 毫升/筆

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
斑塊性乾癬、掌蹠膿皰症、乾癬性關節炎、膿疱性乾癬。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥或賦型劑過敏者。

◆ **藥品儲存：**

1. 冷藏 2°C 到 8°C，不可冷凍，不可振搖。置於外盒內避免光照，直到注射前再取出。
2. 移除底蓋後請於 5 分鐘內 注射。

◆ **用量與用法：**


1. 皮下注射使用，不可用於靜脈輸注。
2. 此注射筆限單次注射使用，使用後應予以丟棄。

注射部位：

- ✓ 大腿前側(建議部位)、下腹部(距肚臍 2 英吋之外的區域)、上手臂背面(僅限於他人協助注射時)。
- * 勿注射於皮膚觸痛、瘀傷、發紅、變硬、變厚、鱗屑或受乾癬影響的區域。



使用步驟及注意事項：



1. 注射筆繼續留在包裝盒內並置於室溫下 **30 分鐘回溫**。
(注射筆不可微波、淋熱水、置陽光直射處或以其他方式加溫，請讓其自行回溫。回溫後請儘速使用)
2. 以肥皂及清水洗淨雙手並擦乾。
3. 以酒精棉片清潔注射部位的皮膚。
(清潔過後，切勿碰觸、煽乾或吹乾注射部位)
4. 注射筆自包裝盒取出，透過檢視窗檢查藥液，藥液應為澄清至淡黃色，可能含有白色或透明的微粒，若溶液中含有大型顆粒，或有變色或混濁的現象，切勿使用。
(注射筆中有氣泡是正常情況，本藥是皮下注射，氣泡不會對您造成傷害)


該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150 【2024/10/22 修訂】

BTC00ED18-02

Guselkumab 注射筆 衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Guselkumab	Tremfya® Injection	特諾雅注射液	100 毫克/1 毫升/筆

5. 旋轉並拉下底蓋，這時看到幾滴液體是正常的。請於**移除底蓋後 5 分鐘內注射**。
(切勿將底蓋再蓋回去，這可能會導致針頭損壞)
6. 注射筆垂直置於皮膚上。
7. 握柄垂直向下壓，灰色針頭護罩消失後再繼續往下壓，**直到看不到綠色筆身**，此時即完成注射。
(注射開始時，可能會聽到喀噠聲，請繼續推動。如果感到阻力，請繼續推動，這是正常現象。推動射藥物會注射，請以您覺得舒適的速度進行注射)
(**注射過程中請勿將注射筆提起來**，因針頭護罩會鎖住導致無法遞送完整劑量)



8. 將注射筆向上提起移開皮膚，此時會看到黃色橫條，表示針頭護罩已被鎖住。



- 注射已完成：
- ✓ 看不見青色筆身
 - ✓ 握柄無法再往下壓
 - ✓ 可能會聽到喀噠聲

9. 注射筆丟入防穿刺的容器內。
10. 注射部位出血請以棉球或紗布按壓注射部位，請勿搓揉注射部位。

◆ 忘記皮下注射藥品時該如何處理？

想起時立即施打。然後應於適當的預定時間施打下一劑。

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

嚴重過敏反應：搔癢、紅疹、蕁麻疹、臉部、唇、舌頭或喉嚨腫脹、呼吸困難。
任何感染症狀。

1. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

頭痛、關節痛、注射部位紅腫熱痛。