

Conjugated estrogen 陰道用製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Conjugated estrogen	Premarin® Vaginal Cream	普馬林陰道乳膏	0.625 毫克/克； 14 克/條




◆ **用途：**（一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡）

1. 萎縮性陰道炎及更年期性外陰萎縮症。

◆ **用量與用法：**

1. 需週期性給藥，例如使用 3 個星期，休息 1 個星期，請遵循醫師指示使用。

使用方法：

	1. 將軟膏管蓋子打開
	2. 將塗藥器拴緊在軟膏管嘴上
	3. 擠壓軟膏管使藥膏依所需劑量壓入塗藥器內
	4. 將塗藥器旋開
	5. 平躺後將膝蓋彎曲
	6. 將裝入藥膏的塗藥器插入陰道深部
	7. 推動推管，將藥膏完全推入陰道
	8. 以肥皂和溫水清洗塗藥器

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 未經診斷之生殖道不正常出血。
2. 已知、懷疑或有乳癌病史者。
3. 已知或懷疑罹患會受雌激素影響之惡性腫瘤。
4. 目前罹患深層靜脈血栓塞、肺栓塞或曾罹患這些疾病者。
5. 目前罹患動脈栓塞疾病者(中風、心肌梗塞等)或曾罹患該疾病者。
6. 已知會對普力普林陰道乳膏產生過敏反應或血管性水腫。
7. 肝功能異常或肝臟疾病。
8. 已知的 C 蛋白、S 蛋白、或抗凝血酵素缺損或其他血栓好發者的疾病。
9. 已知或懷疑懷孕者。

◆ **忘記用藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快使用；若接近下次用藥時間，按時使用下次劑量即可，千萬不可使用兩倍劑量。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2024/9/27 修訂】

BTC00EW24-02

Conjugated estrogen 陰道用製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Conjugated estrogen	Premarin® Vaginal Cream	普馬林陰道乳膏	0.625 毫克/克； 14 克/條

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 20-25°C 以下，避光、避濕及避熱
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用

◆ **注意事項：**

1. 本藥為陰道內使用，請遵照醫師處方之用法及劑量使用，未經醫師同意，切勿自行停藥或改變劑量。
2. 懷孕和哺乳婦女禁止使用。
3. 有以下病史者請主動告知醫師，不建議使用本藥：動脈栓塞、深層靜脈栓塞、肺栓塞、肝功能不全、乳癌、婦科癌症等。
4. 使用期間若有不正常陰道出血的情況請回診。
5. 使用前應將雙手洗淨，使用完畢後也洗淨雙手，避免觸碰到雙眼。
6. 普馬林陰道藥膏可能降低橡膠製或乳膠製保險套效果，而使避孕失敗。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
 - 血栓：胸痛或胸悶；咳血；呼吸短促、單腿或單臂腫脹、發熱、麻木、膚色改變或疼痛；或說話困難或呼吸困難。
 - 乳房中有腫塊、乳房疼痛或脹痛或乳頭分泌物。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

陰道刺激、陰道異常出血或點狀出血、乳房觸痛或乳房緊脹感。頭痛、頭暈、高血壓等不適。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2024/9/27 修訂】

BTC00EW24-02