

商品名	學名及規格	備註說明
Actein tab	Acetylcysteine 600mg/tab	發泡錠
Afinitor	Everolimus 5mg/tab	錠劑放入水中(約30ml)，輕輕攪拌至崩散溶解後(約7分鐘)立即使用
Alecensa	Alectinib 150mg/cap	將完整膠囊置於40ml溫水中攪拌至溶解(約10分鐘)後立即使用
Alunbrig	Brigatinib 90mg/tab	將錠劑加水攪拌至崩散成懸浮液後立即使用
Androcur	Cyproterone Acetate	將錠劑加水攪拌至崩散成懸浮液後立即使用
Arheuma	Leflunomide 20mg/tab	磨粉後立即管灌
Arimidex	Anastrozole 1mg/tab	將錠劑加10ml水攪拌至崩散成懸浮液(至少5分鐘)，懸浮液應立即使用
Atanaal	Nifedipine 5mg/cap	軟膠囊
Bokey	Aspirin 100mg/cap	可將膠囊打開，但腸溶顆粒不可磨粉，腸溶顆粒與水混合後管灌給藥。
Cinolone	Ciprofloxacin 250 mg/tab	磨粉後味道變差，磨粉管灌給藥
Co-Midis	Amlodipine5mg/ Telmisartan	易受潮，管灌前再將藥錠由鋁箔中取出
Curam	Amoxicillin 875mg /Clavulanate 125mg/tab	易潮解，磨粉後立即管灌給藥
Dexilant	Dexlansoprazole DR 60mg/caps	可打開膠囊與水混合後管灌給藥。膠囊顆粒不可磨碎。
Dicetel	Pinaverium 100mg/F.C.tab	磨粉管灌給藥
Doxymycin	Doxycycline 100mg/E.C.cap	可將膠囊打開，但腸溶顆粒不可咬碎或磨粉
Duodart	Dutasteride 0.5 mg + Tamsulosin 0.4 mg /cap	藥粉對口咽部黏膜有刺激性，將膠囊內容物倒入水中，溶解後管灌給藥
Efexor XR	Venlafaxine 75mg/cap	可將膠囊打開，內含持續釋放劑型的顆粒，不可磨粉咬碎
Eltroxin	Levothyroxine 50mcg/tab, 100mcg/tab	磨粉管灌給藥
Endoxan	Cyclophosphamide 50mg/tab	將錠劑加水攪拌至崩散成懸浮液後立即使用
Exjade disp.tab	Deferasirox 125mg/tab	可溶性錠劑，泡水溶解後立即使用
Femara	Letrozole 2.5mg/tab	將錠劑加水攪拌至崩散溶解後立即使用
Fosamax PLUS	Alendronic acid 70mg/ Colecalciferol 5600IU	可磨粉後管灌，但需與管灌配方分開給
Giotrif	Afatinib 40mg/tab	錠劑放入約100 mL飲用水(非碳酸類)中崩散，不可使用其他液體，不要壓碎，攪拌直到錠劑崩散成極小的顆粒(約15分鐘)後，立即管灌，再以約100 mL水沖洗杯緣後管灌。
Glivec	Imatinib mesylate 100mg/tab	將錠劑泡在一大杯水或蘋果汁中(100mg錠劑泡50ml，400mg錠劑泡200ml)，攪拌至藥錠崩散成懸浮液後立即使用
Hydrea	Hydroxyurea 500mg/cap	為減低接觸的風險，請穿戴拋棄式手套，將膠囊內藥粉倒入水中攪拌均勻後管灌。接觸瓶子或膠囊前後，均應清洗雙手
Ibrance	Palbociclib 125mg/cap, 100mg/cap	將膠囊置於20ml針筒中並加入15ml沸水，將針筒倒置並推到20ml處，蓋上針筒蓋並搖晃4分鐘，靜置10分鐘，給藥後以10ml水潤洗五次並使病人服下
Imuran	Azathioprine 50mg/tab	將錠劑加10ml水攪拌至崩散溶解(至少5分鐘)後立即使用

商品名	學名及規格	備註說明
Iressa	Gefitinib 250mg/tab	不要壓碎，將錠劑放入半杯飲用水(非碳酸類)中，攪拌直到錠劑崩散(約15分鐘)後，立即使用，再以半杯水沖洗杯緣後管灌
Juvela N	Tocopherol Nicotinate 200mg/cap	軟膠囊
Keto	Ketorolac 10mg/cap	可將膠囊打開，腸溶微粒不可磨粉咬碎
Lenvima	Lenvatinib 4mg/cap	將膠囊靜置於一杯水或蘋果汁中至少10分鐘(膠囊不需打開或壓碎)，再攪拌至少3分鐘溶解，管灌後，再加入水或蘋果汁於杯中，攪勻後再管灌。
Lonsurf	Trifluridine/Tipiracil HCl 15mg/tab, 20mg/tab	將錠劑加水攪拌至崩散成懸浮液(約15分鐘)後立即使用
Lorviqua F.C. tab	Lorlatinib 25mg/tab	將錠劑加水攪拌至崩散溶解後立即使用
Micardis	Telmisartan 40mg/tab	易受潮，管灌前再將藥錠由鋁箔中取出
Minirin melt	Desmopressin 60mcg/tab	口溶錠，泡水後管灌給藥。但改由腸胃道吸收需調整劑量
MXL ★	Morphine sulfate 60mg/cap	可打開膠囊，但不可壓碎或嚼碎其小顆粒
Nexavar	Sorafenib 200mg/tab	將兩顆200mg錠劑置於60ml水中，5分鐘後開始攪拌至溶解，10分鐘之內服下
Nolvadex	Tamoxifen 10mg/tab	將錠劑加水攪拌至崩散溶解(約5分鐘)後立即使用
Nosma	Theophylline 125mg/cap	可將膠囊打開，緩釋微粒不可磨粉或咬碎
Nubeqa	Darolutamide 300mg/tab	將錠劑加水攪拌至崩散成懸浮液後立即使用
Ofev	Nintedanib 150mg/cap	軟膠囊
Omacor Soft Capsules	Omega-3- Acid Ethyl Esters 90 1000mg/cap	軟膠囊
Pentasa granules	Mesalazine 2g/sachet	顆粒不可嚼碎，可以泡水後管灌給藥
Protase	Pancrelipase 280mg/cap	可將膠囊打開，腸溶微粒不可咬碎磨粉
Roaccutane	Isotretinoin 10mg/cap	軟膠囊
Rytmonorm	Propafenone 150 mg/tab	粉末具有苦味及表面麻醉作用，磨粉後管灌給藥
Salicret	Pilocarpine 5mg/tab	磨粉後立即管灌給藥
Sandimmun NEORAL	Cyclosporin 25 mg/cap, 100 mg/cap	軟膠囊
Sinclote cap	Clodronate 400mg/cap	將膠囊內容物加水後管灌，但需與管灌配方分開給
Singulair chewable	Montelukast sodium 4mg/tab,	磨粉後管灌給藥
Sprycel	Dasatinib 50mg/tab	加入30ml不含防腐劑的純柳橙汁或純蘋果汁，靜置5分鐘，沿容器底部輕轉容器三秒，重複四次共20分鐘
Stivarga	Regorafenib 40mg/tab	將錠劑加水攪拌，崩散溶解成懸浮液後管灌給藥
Strocain	Oxethazaine 5 mg/Polymigel 224 mg/tab	磨粉後管灌給藥
Sutent cap	Sunitinib 12.5mg/cap	將膠囊內的藥粉加水攪拌均勻後管灌給藥
Tagrisso	Osimertinib mesylate 80mg/tab	將錠劑崩散於15 mL非碳酸水中(藥品不會完全溶解)，另以15 mL的開水沖洗殘餘藥並移至灌食空針，將30 mL的藥液經鼻胃管給藥，再以約30 mL的開水沖洗管道
Takepron OD	Lansoprazole 30mg/tab	口溶錠，腸溶微粒。不可咬碎磨粉，加水崩解後，15分鐘內使用。
Tamlosin D	Tamsulosin 0.2mg/tab	持續釋放口溶錠，泡水後管灌，內含緩釋顆粒，不可研磨或咬碎
Tamos cap	Temozolomide 100mg/cap, 20mg/cap	打開膠囊將藥粉加入酸性溶液(如柳橙汁、蘋果汁)，攪拌均勻後管灌給藥

商品名	學名及規格	備註說明
Tarceva	Erlotinib 150mg/tab	錠劑放入100ml水中，輕輕攪拌至崩散成懸浮液(約5-8分鐘)後立即管灌使用
Tasigna cap	Nilotinib 200mg/cap	膠囊應整顆吞服，無法吞嚥者可將內容物混在一茶匙的蘋果泥中，管灌給藥
Topamax	Topiramate 100 mg/tab	磨粉後味道很苦，磨粉後管灌給藥
Topamax sprinkle	Topiramate 25mg/cap	膠囊可打開使用
Trexan	Methotrexate 2.5mg/tab	將錠劑加水攪拌成懸浮液後管灌給藥
TS-1	Tegafur 20mg/ Gimeracil 5.8mg/ Oteracil K 19.6mg/cap	在容器中注入20ml、55°C的水，放入整顆膠囊靜置5分鐘，接著搖晃或攪拌使其成懸浮液
U-Ca	Calcitriol 0.25mg/cap	軟膠囊
UFUR	Tegafur 100mg/Uracil 224mg/cap	將膠囊泡在37°C左右溫水10-20mL中，待溶解後馬上灌食(振搖容易起泡)
Utrogestan	Progesterone 100mg/cap	軟膠囊
Xalkori	Crizotinib 250mg/cap	將膠囊打開，藥粉置於針筒內後，取一杯子將半杯沸水、半杯室溫水混合，取15毫升加入針筒並搖晃4分鐘混合均勻，靜置10分鐘後以NG管灌
Xanthium	Theophylline 400mg/cap	膠囊可打開使用，緩釋微粒不可磨粉或咬碎
Xeloda	Capecitabine 500mg/tab	錠劑加入200ml溫水中，攪拌約15分鐘使崩散成懸浮液後立即管灌使用
Zyprexa Zydis	Olanzapine 5mg/tab	口溶劑型，泡水後管灌給藥
Zytiga	Abiraterone acetate 250mg/tab	將錠劑加水攪拌溶解後管灌給藥