

商品名	學名及規格	備註說明
Actein tab	Acetylcysteine 600mg/tab	發泡錠
Afinitor【專案】	Everolimus 5mg/tab	具致畸胎性，磨粉後散發的藥物微粒或粉塵可能會傷害給藥的照護者。建議整粒吞服，不可磨粉、咀嚼或咬碎錠劑
Alecensa【專案】	Alectinib 150mg/cap	膠囊整粒吞服，切勿打開膠囊或將膠囊內容物溶化使用
Alglutol DR tab	Acamprosate calcium 333mg/tab	緩釋的腸溶膜衣錠，建議整粒吞服，不可磨粉、咀嚼或咬碎錠劑
Alunbrig【專案】	Brigatinib 90mg/tab	具致畸胎性、生殖毒性，磨粉後散發的藥物微粒或粉塵可能會傷害給藥的照護者，藥錠應整顆吞服，請勿磨碎或咀嚼藥錠
Androcur	Cyproterone Acetate	具致畸胎性、生殖毒性，磨粉後散發的藥物微粒或粉塵可能會傷害給藥的照護者。建議整粒吞服，不可磨粉
Apo-atomoxetine	Atomoxetine 25mg/cap, 40	藥粉對眼睛有刺激性，不應打開膠囊，須整顆服用
Arheuma	Leflunomide 20mg/tab	易受潮，磨粉後立即使用
Arimidex	Anastrozole 1mg/tab	磨粉後散發的藥物微粒或粉塵可能會傷害給藥的照護者。建議整粒吞服，不可磨粉
Atanaal	Nifedipine 5mg/cap	膠囊內為液態藥品，建議整粒吞服
Betmiga PR tab	Mirabegron 50mg/tab	持續性藥效錠，不可嚼碎、切割或壓碎
Bokey	Aspirin 100mg/cap	膠囊內含腸溶劑型的顆粒，可打開服用，但顆粒不可嚼碎
Buporin SR	Bupropion 150mg/tab	持續性藥效錠，應整粒吞服，不可切半、壓碎或嚼碎。
CIBINQO	Abrocitinib 200mg/tab	錠劑應以水整粒吞服，不得切割、壓碎或嚼碎
Cinolone	Ciprofloxacin 250mg/tab	磨粉後味道變差，不建議磨粉，但可剝半服用
Co-Midis	Amlodipine 5mg/ Telmisartan	易受潮，不可磨粉但可剝半使用，剝半後應盡快服用
Concerta	Methylphenidate 18 mg/tab	持續釋放劑型，不可剝半或嚼碎
Curam	Amoxicillin/Clavulanate, 1 g/tab	磨粉之後易潮解，可剝半但不可磨粉，剝半後應盡快服用
Depakine chrono	Valproate sodium 500 mg/tab	持續釋放劑型，可剝半但不可嚼碎
Desud plus SL	Buprenorphine 8 mg/ Naloxone	舌下錠，直接含於舌下，不可磨粉可剝半
Detrusitol SR PR	Tolterodine L-tartrate 4mg/cap	持續性藥效膠囊，不可磨粉不可剝半
Dexilant	Dexlansoprazole 60mg/cap	緩釋膠囊，請勿咀嚼或磨粉，須整粒吞服。若無法吞嚥膠囊，請打開膠囊與蘋果醬或水混合馬上服用
Dicetel	Pinaverium 100mg/F.C.tab	會對口腔、食道黏膜造成刺激，請勿口含或咀嚼，不可磨粉，也不建議剝半
Doxaben XL	Doxazosin mesylate 4 mg/tab	持續釋放劑型，不可剝半或嚼碎
Doxymycin	Doxycycline HCl 100 mg/cap	膠囊內含腸溶劑型的顆粒，可打開服用，但顆粒不可嚼碎
Dulcolax	Bisacodyl 5mg/tab	腸溶劑型，不可剝半或嚼碎
Duodart	Dutasteride 0.5mg/ Tamsulosin 0.4mg	dutasteride可能會對口咽部黏膜造成刺激，膠囊應整粒吞服，切勿嚼食或將膠囊打開
Duxetine	Duloxetine 30mg/cap	為腸膜衣藥丸，應整粒吞服；不可壓碎、咀嚼，亦不可打開膠囊及將膠囊內容物與食物和液體混和服用
Efexor 75 XR	Venlafaxine HCl 75 mg/cap	膠囊內含持續釋放劑型顆粒，可打開服用，但顆粒不可嚼碎

商品名	學名及規格	備註說明
Eltroxin	Levothyroxine 50mcg/tab, 100mcg/tab	不可剝半，因會使錠劑碎裂，可能產生服用劑量不一致之風險
Endoxan	Cyclophosphamide 50mg/tab	具遺傳毒性及致突變性，會影響生育力或對胎兒造成傷害，磨粉後散發的藥物微粒或粉塵可能會傷害給藥的照護者。建議整粒吞服，不可磨粉
Exjade disp.tab【專案】	Deferasirox 125mg/tab	可溶性錠劑，泡水溶解後飲用，請勿直接吞服或咀嚼
Femara【專案】	Letrozole 2.5mg/tab	具致畸胎性，磨粉後散發的藥物微粒或粉塵可能會傷害給藥的照護者。建議整粒吞服，不可剝半或磨粉
Fosamax PLUS	Alendronic acid 70mg/ Colecalciferol 5600IU	磨碎後的藥品粉末對食道黏膜有刺激性，不可磨粉也不可剝半
Giotrif【專案】	Afatinib 40mg/tab	可能影響生育力及致胎兒傷害，磨粉後散發的藥物微粒或粉塵可能會傷害給藥的照護者。建議整粒吞服不可磨粉、壓碎或嚼碎
Glivec【專案】	Imatinib mesylate 100mg/tab	磨粉後散發的藥物微粒或粉塵可能會傷害給藥的照護者。建議整粒吞服，不可磨粉
Hydrea	Hydroxyurea 500mg/cap	藥粉可能會傷害給藥的照護者，建議整粒吞服
Ibimo	Isosorbide-5-mononitrate	持續釋放錠，可剝半不可磨粉
Ibrance	Palbociclib 125mg/cap, 100mg/cap	具致畸胎性，磨粉後散發的藥物微粒或粉塵可能會傷害給藥的照護者。建議整粒吞服，不可壓碎或打開膠囊
Imuran	Azathioprine 50mg/tab	會刺激黏膜造成噁心嘔吐、腹瀉，不建議磨粉使用
Iressa	Gefitinib 250mg/tab	磨粉後散發的藥物微粒或粉塵可能會傷害給藥的照護者。建議整粒吞服，不可磨粉
Isoptin SR	Verapamil 240mg/tab	持續釋放劑型，可剝半但不可嚼碎
Juvela N	Tocopherol Nicotinate 200mg/cap	軟膠囊
Keto	Ketorolac 10mg/cap	膠囊內含腸溶劑型的顆粒，可打開服用，但顆粒不可嚼碎
Kremezin	Spherical absorptive carbon 0.5g/tab,4tab/pack	速崩劑型，少量的水即可崩解，請放入口中以水讓其崩解後吞服
Lenvima	Lenvatinib 4mg/cap	無法吞服者可將膠囊靜置於水或蘋果汁中至少10分鐘(膠囊不需打開或壓碎)，再攪拌至少3分鐘溶解，飲用後，再加入水或蘋果汁於杯中，攪勻後再飲用
Linicor	Lovastatin 20mg/ Niacin 500mg	緩釋劑型，不可嚼碎、剝半或磨粉
Lonsurf【專案】	Trifluridine/Tipiracil HCl, 15mg/tab, 20mg/tab	具細胞毒性及致畸胎性，磨粉後散發的藥物微粒或粉塵可能會傷害給藥的照護者。建議整粒吞服，不可剝半或磨粉
LoraPseudo SR	Pseudoephedrine 240mg/ Loratadine 10mg	持續釋放劑型，不可嚼碎、剝半或磨粉
Lorviqua F.C. tab	Lorlatinib 25mg/tab	可能有致癌性、致畸胎性及基因毒性，磨粉後散發的藥物微粒或粉塵可能會傷害給藥的照護者。建議整粒吞服，不可剝半或磨粉
Loxol SR	Ambroxol SR 75mg/tab	持續釋放劑型，不可剝半或嚼碎
Lynparza	Olaparib 150mg/tab	磨粉後散發的藥物微粒或粉塵可能會傷害給藥的照護者。建議整粒吞服，不可剝半、壓碎、溶解或磨粉
Madopar HBS	Levodopa 100mg/ Benserazide	持續釋放劑型，膠囊不可打開
Micardis	Telmisartan 40mg/tab	易受潮，不可磨粉可剝半，剝半後應盡快服用
Minirin melt	Desmopressin 60mcg/tab	口溶錠，不可磨粉可以剝半

商品名	學名及規格	備註說明
Mirapex PR	Pramipexole 1.5mg/tab,	持續釋放劑型，不可剝半或嚼碎
MXL	Morphine sulfate 60mg/cap	持續釋放劑型，可打開膠囊，但不可壓碎或嚼碎其小顆粒
Myfortic	Mycophenolate sodium 180mg/tab	腸衣錠，不可磨粉不可剝半
Natrilix SR	Indapamide 1.5mg/tab	持續釋放劑型，不可剝半或嚼碎
Nexavar	Sorafenib 200mg/tab	具致畸胎性，磨粉後散發的藥物微粒或粉塵可能會傷害給藥的照護者。建議整粒吞服，不可剝半或磨
Nifedipine	Nifedipine 30mg/tab	持續釋放劑型，不可剝半或嚼碎
Nitrostat SL	Nitroglycerin 0.6 mg/tab	舌下含錠，直接含於舌下，不可嚼碎，不可吞服
Nolvadex	Tamoxifen 10mg/tab	磨粉後散發的藥物微粒或粉塵可能會傷害給藥的照護者。建議整粒吞服，不可磨粉
Nosma	Theophylline anhydrous 125mg/cap	膠囊內含持續釋放劑型的顆粒，可打開服用，但顆粒不可嚼碎或磨粉
Nubeqa【專案】	Darolutamide 300mg/tab	磨粉後散發的藥物微粒或粉塵可能會傷害給藥的照護者。建議整粒吞服，不可剝半或磨粉
Numient ER	Carbidopa 48.75mg/ Levodopa 195mg /cap	膠囊內含持續釋放劑型的顆粒，可打開服用，但顆粒不可嚼碎或磨粉
Ofev	Nintedanib 150mg/cap	軟膠囊
Omacor Soft Capsules	Omega-3- Acid Ethyl Esters 90 1000mg/cap	軟膠囊
Oxbu ER	Oxybutynin 5mg/tab	緩釋錠，可剝半但不可咀嚼或壓碎
OxyNorm IR cap	Oxycodone HCl 5mg/cap	膠囊切開、剝開、咀嚼、敲碎或溶解後，會使大劑量的有效成分釋出，增加過量風險
Pantoloc	Pantoprazole 40mg/tab	腸溶膜衣錠，不可磨粉不可剝半
Pentasa granules	Mesalazine 2g/sachet	持續性藥效顆粒劑，不可磨碎或咀嚼
Pradaxa	Dabigatran etexilate 110mg/cap, 150mg/cap	請整顆吞服，不可弄破、咀嚼或打開膠囊服用，因可能會增加出血風險
Protase	Pancrelipase 280mg/cap	膠囊內含腸溶劑型的顆粒，可打開服用，但顆粒不可嚼碎或磨粉，可剝半
Rancad ER	Ranolazine 500mg/tab	持續性藥效錠應整顆吞服，不可壓碎、折斷或嚼碎
Regrow	Dextromethorphan 60mg/tab	持續釋放劑型，可剝半但不可嚼碎
Roaccutane	Isotretinoin 10mg/cap	軟膠囊，具致畸胎性，不可磨粉不可剝半
Rozlytrek	Entrectinib 200mg/cap	膠囊應整顆吞服，不可打開、壓碎、咀嚼或溶解內容物
Rybelsus	Semaglutide 3mg/tab, 7mg/tab, 14t	應搭配少量的水（最多半杯，相當於 120 毫升）整顆吞服。錠劑不應剝開、壓碎或咀嚼
Rytmonorm	Propafenone 150mg/tab	粉末具有苦味及表面麻醉作用，不建議磨粉，不可磨粉不可剝半
Salazine	Sulfasalazine 500mg/tab	腸溶劑型，不可剝半或嚼碎
Salicret	Pilocarpine 5mg/tab	具吸溼性，不建議磨粉，若有磨粉之必要，請於服用前再磨粉
Sandimmun	Cyclosporin 25mg/cap, 100mg/cap	軟膠囊，不可磨粉不可剝半
Seroquel XR	Quetiapine 300mg/tab	持續性藥效錠，不可磨粉可剝半
Sinclote cap	Clodronate 400mg/cap	粉末對食道黏膜有刺激性，應整粒吞服，膠囊不可打開使用
Singulair chewable	Montelukast sodium 4mg/tab, 5mg/tab	咀嚼錠，須避光與防潮，不可磨粉可剝半

商品名	學名及規格	備註說明
Sprycel【專案】	Dasatinib 50mg/tab	磨粉後散發的藥物微粒或粉塵可能會傷害給藥的照護者。建議整粒吞服，不可剝半或磨粉
Stazyme	Biodiastase 2000 20mg/ Cellulase AP3 10mg/ Lipase AP6 15mg/ Prozyme 6 5mg	子母錠，子錠為腸衣錠，不可磨粉不可剝半
Stivarga	Regorafenib 40mg/tab	具致畸胎性，磨粉後散發的藥物微粒或粉塵可能會傷害給藥的照護者。建議整粒吞服，不可剝半或磨
Strocain	Oxethazaine 5mg/ Polymigel	具局部麻醉作用，建議整粒吞服，不可磨粉不可剝
Sutent cap	Sunitinib 12.5mg/cap	磨粉後散發的藥物微粒或粉塵可能會傷害給藥的照護者。建議整粒吞服
Tagrisso	Osimertinib mesylate 80mg/tab	磨粉後散發的藥物微粒或粉塵可能會傷害給藥的照護者。建議整粒吞服，不可剝半或磨粉
Takepron OD	Lansoprazole 30mg/tab	口溶錠，腸溶微粒不可咬碎或磨粉。管灌病人欲使用可加水使其崩解，並在15分鐘內使用。可剝半
Tamlosin D	Tamsulosin 0.2mg/tab	持續釋放口溶錠，可剝半不可磨粉嚼碎
Tamos cap	Temozolomide 100mg/cap, 20mg/cap	膠囊打開後散發的藥物微粒或粉塵可能會傷害給藥的照護者。建議整粒吞服
Tarceva【專案】	Erlotinib 150mg/tab	磨粉後散發的藥物微粒或粉塵可能會傷害給藥的照護者。建議整粒吞服，不可磨粉。
Tasigna cap	Nilotinib 200mg/cap	膠囊應整顆吞服，無法吞嚥者可將內容物混在一茶匙的蘋果泥中，15分鐘內服下
Tecfidera	Dimethyl fumarate 120mg/cap, 240mg/cap	膠囊應整粒吞服。由於微粒錠外的腸溶衣可防止刺激腸道，膠囊或其內容不要壓碎、拆半、溶解、吸吮或咀嚼
Tegretol CR	Carbamazepine 200 mg/tab	持續釋放劑型，可剝半但不可嚼碎（除醫師另有指示）。
Temgesic SL	Buprenorphine 0.2 mg/tab	直接含於舌下，不可磨粉可剝半
Throne	Pentoxifylline 100mg/tab	腸溶糖衣錠，不可嚼碎、剝半或磨粉
Topamax	Topiramate 100 mg/tab	磨粉後味道很苦，不建議磨粉，但可剝半服用。吞嚥困難或以鼻胃管進食者，可以同成分劑量較小的妥泰分散型膠囊(Topamax Sprinkle)代替
Topamax Sprinkle	Topiramate 25 mg/cap	膠囊內含小顆粒，磨碎後味道很苦，建議整粒吞服。若不能整粒吞服，可將膠囊打開，小藥粒灑於軟質食物一起吞服，無須咀嚼
Trexan	Methotrexate 2.5mg/tab	磨粉後散發的藥物微粒或粉塵可能會傷害給藥的照護者。建議整粒吞服，不可磨粉
TS-1	Tegafur 20mg/ Gimeracil 5.8mg/ Oteracil K 19.6mg/cap	膠囊打開後散發的藥物微粒或粉塵可能會傷害給藥的照護者。建議整粒吞服
U-Ca	Calcitriol 0.25mg/cap	軟膠囊，不可磨粉
UFUR	Tegafur 100mg/Uracil 224mg/cap	膠囊打開後散發的藥物微粒或粉塵可能會傷害給藥的照護者。建議整粒吞服
Utrogestan	Progesterone micronised	軟膠囊，不可磨粉
Verzenio【專案】	Abemaciclib 150mg/tab	可能影響生育力及致胎兒傷害，磨粉後散發的藥物微粒或粉塵可能會傷害給藥的照護者。建議整粒吞服不可磨粉、壓碎或嚼碎
Vizimpro【專案】	Dacomitinib 30mg/tab, 45mg/tab	可能致胎兒傷害，磨粉後散發的藥物微粒或粉塵可能會傷害給藥的照護者。建議整粒吞服不可磨粉、壓碎或嚼碎

商品名	學名及規格	備註說明
Voltaren 75 SR	Diclofenac sodium 75 mg/tab	持續釋放劑型，不可剝半或嚼碎
Wellbutrin XL	Bupropion 150mg/tab	持續釋放劑型，不可剝半或嚼碎
Xalkori【專案】	Crizotinib 250mg/cap	可能致胎兒傷害，膠囊打開後散發的藥物微粒或粉塵可能會傷害給藥的照護者。膠囊整粒以水送服，不可壓碎或打開
Xanthium	Theophylline monohydrate 400 mg/cap	膠囊內含持續釋放劑型的顆粒，必要時可打開膠囊服用，但顆粒不可嚼碎
Xeloda	Capecitabine 500mg/tab	磨粉後散發的藥物微粒或粉塵可能會傷害給藥的照護者。建議整粒吞服，不可磨粉
Xigduo XR	Dapagliflozin 10mg/ Metformin 1000mg/tab	持續釋放劑型，不可剝半或嚼碎
Xtandi	Enzalutamide 40mg/cap	軟膠囊，為細胞毒性藥物，膠囊請整粒吞服，不可刺破、咬破或溶解
Zyprexa Zydis	Olanzapine 5mg/tab	口溶錠，不可磨粉可以剝半
Zytiga	Abiraterone acetate 250mg/tab	可能致胎兒傷害或流產，磨粉後散發的藥物微粒或粉塵可能會傷害給藥的照護者。建議整粒吞服不可磨粉、壓碎或嚼碎